


西藥畧釋

卷三

B. Chinese:

Vol III

3



Page
補藥論

夫能令胃消化及能令腦與肌肉生力者，卽謂之補劑。顧補劑不一，亦宜分晰。其助胃消化而令生血者，如服黃連、瓜沙及龍膽草等藥是也。其入血養腦而能助腦發力者，如服金雞納霜及桂拏先、高拏等劑是也。其人血而能助血變赤及助肌肉生力者，如服鐵劑等類是也。然而補藥之宜服，正不僅有此妙用也。舉凡士農工商，勤勞過度而致胃則弱，身則虛，皆宜服也。卽推之婦人，月經過多，白帶過多，及瘡疥流膿過多而致面則白，辱則青，亦宜服也。惟補藥則由漸獲效，非若吐瀉等劑，隨服隨應耳。且補身之道，雖藉藥力，然或擇醫不精，信醫不專，亦終

無濟此所以得良醫而能篤信亦卽補身之一道也至醫士
務宜品學兼優技則熟而心則細彼病者方能以身命相託誠
以醫道所關甚重不容不慎也他如身熱及內腑有炎此則
雖應服補劑亦不宜驟服蓋必先清後補庶得妥適且補劑
雖能補胃益身然使過服久服則或令胃難消化而身體亦將
四而轉弱此又不可不知也

鐵劑總論

用金類作補藥，當以此劑爲上品。蓋世上有多種

動植之物，內面有鐵，卽人血亦然。此醫者所爲設鐵劑也。功

用補而斂，能開胃，助消化，服之可令血多而紅。凡血弱血少

者宜服。或瀉大便過多，或癰疽潰膿過多，宜服。婦人胃不

消化，面白唇青，係因瘰癧、白帶而致者，宜服。小兒骨軟，係由

鼻內牙內流血過多所致者，宜服。服此藥忌空腹，飯後服之

可也。大抵乍服鐵劑，不甚見驗，惟連服數旬，或數月，方獲功

效。鐵劑服後，翌日糞色必黑，若服至十餘日，而覺大便艱澀

卽宜暫停，惟俟糞色如常，方可再服。且服鐵劑而致大便乾

結，宜兼服輕瀉藥，誠以瀉藥亦能助鐵入血，而有以補之也。

鐵散 製法 以鐵銹入筒火煅至紅而即以輕氣過之令其

食出養氣白可成為純鐵但此物亦無甚功用究不如服鐵劑

妙

鐵養溼散 此散木 面有水 製法

鐵養礬養水 四安 土量 鎔炭養水 三十三 安土量 清水 二十安 土量

先將鐵養礬養水與清水相和然後以鎔炭養水加入少

頃則用布濾去該水而所賸之溼散復以清水漂洗漂至

濾出之水以鋤練投入而不能結鹽為度 此散須帶溼

入罐不必弄乾誠以散之乾者每百分亦必面水十八分

也

功用 能作補劑 服法 每服一分至二分但醫家亦鮮用

雜治通用

誤服信石用此救之甚驗緣該散一經入腹即能與信

石相合而結為水不能溶之鹽也但此藥新製者方能解

信石之毒若稍舊便不堪用

鐵養散

即鐵紅散

製法

用鐵礬養

俗名青礬

及礬炭養水化和勻將

見墜底者即此散也

形色

新製者色青黑少頃即吸養氣

變為紅色

氣味

味澀無臭

溶化

水不能化

服法

作補藥每服八釐至四分每日三服凡身弱血虛者服之宜

方劑

一方

婦人閉經孱弱而致面青唇白者宜服

鐵紅散

一分二釐

衣畢格

二釐

汞石散

三釐

和勻作一服，每日二服，或間服鴉囉瀉藥少許亦妙。但此症須連服二十餘日，亦見效驗。

方論

或面上半邊腦筋痛，係由身虛血弱而致者，每服一錢，每六點鐘一服，但須以漸加多，服至獲效爲度。其在小兒七八歲者，每服五分，每日四五服。血少心跳，每服一二錢，每日二三服。或婦人陰戶潛流惡水，或小孩麻疹後而耳出膿，每次服五分，每日三服，均妙。

鐵炭養糖散

製法

鐵礬養

二兩
六錢

輕炭養

一兩

各以沸水四觔溶化，然後將兩水和勻，急急攪之，隨即蓋密，俟

過十二時將水倒去而所賸之粉再用沸水八觔攪勻俟其凝

定又復倒去該水而後將粉入袋用法壓去餘水壓畢取出加

入白糖八錢和勻研幼慢火焙乾用樽貯密又法用鐵炭

養糖散八錢玫瑰花膏二錢和勻作丸功同鐵劑

主治身虛血弱一服法每服一分至五分每日二三服

淨礬石粉製法

雙鐵礬養水五安半量鐵礬養水兩安鎢炭養水六十四安士量

清水足用先用清水三十二安士量次將鐵礬養水兩安放入清

水內俟溶化再加雙鐵礬養水後將鎢炭養水和勻煲滾

約兩點鐘時時攪之隔以綿花布再過水至加入銀綠此

水不見起烟為度，用火焙乾火之熱一百二十度，即此藥也。

形色

此散棕黑色，用磁石試之可吸起。此磁石乃係鐵質極，海鹽在山所生者同。

功用

同鐵養散

服法

每服八釐半至一分七釐

青礬

即鐵礬養

製法

以淡礬強水化鐵碎，俟化盡，煎去水，自可

凝珠，然此猶未淨也，惟將該珠再用水化，濾隔，加入礬強水少許，同煎，俟其再復結珠，庶得純淨。

形色

綠豔

味澀

溶化

水能溶，若經煨，則本體之水可

化已質

功用

補斂為鐵劑之上品，凡血弱身虛者宜服。

服法

每服此珠二釐至八釐，若用枯者，一釐至三釐。

清水化服，或倘別藥作丸均可。

宜忌 但此藥不宜過服多服否則未免腹痛作嘔或至損身

血少面白者宜合龍膽草膏及鴉囉硫磺等藥作丸服之

甚驗 或以青礬水化並加些礬強水同服均妙

方劑 一方 身弱血少心跳婦人月經不行等症

青礬 一分 二釐 鴉囉 一分 二釐 玉桂末 三分 二釐 以水和勻作丸

八粒每日飯後服二粒

一方 瘧疾之後脾或發脹服之效

青礬 五錢 滑筌散 一錢 大黃散 一錢 鈹葡酸散 一錢

加林啤散 一錢如無此藥不用亦可 共研勻作散分十包每日早晚

服一包至瀉為度若猶未瀉則每日須多服二次

鐵燐養

製法

卷二

鐵燐養

五

鐵燐養

四兩

鐵燐養

四百錢

汽水

一百二十
八安七量

即將汽水分作兩盤一化鐵燐養一化鐵燐養化訖則以二水

相和貯俟結鹽此則鐵燐養也由是以熱水漂洗微火焙乾

功用 同鐵劑 服法 療治各症悉照鐵劑服之

鐵火燐養

製法

鐵燐養

七安

鐵燐養

七安土
或足用

檸檬酸

兩安

輕淡

水

五安半量
或足用

清水

足用

先將鐵燐養全放入磁鍋內燂鎔復煎至乾即將此乾散置

鐵鍋內煎至僅見紅色取起加入清水四十八安再慢火煎至

銻化隔淨俟其冷至五十度

係法圖度表

乃以鐵罐蓋水漸漸加入

加至全結成鹽爲度攪勻用布隔時布面有鹽珠再加清水以
逼出之水味淡極爲止用磁鍋一個先稱過重若干將布面取
出之鹽珠放入磁鍋內另用器將檸檬酸與輕淡水全併和勻
化清卽傾入磁鍋內與鹽珠和勻慢火煎至臘十六安士爲度
攪勻在厚玻片面冷定成爲薄片卽此藥也入玻桎樽貯密收
在暗處以不見光爲妙

形色

薄片色綠

氣味

無臭味微鹹頗澀

溶化

水能

化

功用

此藥鐵質多故鐵類補藥之內此爲上品

服法

鐵鈹葡鹽

製法

錢鈹有鹽

鐵鈹鹽水 十六安

鈹葡酸散 七安

清水 六十四安士量

先將鐵鈹養水照上文第十篇內製成鐵鈹養濕散另將鈹

葡酸散和清水六十四安士燂熱至一百四十度勿令熱度減

少將鐵鈹養濕散逐漸加入至不能化為止將此水隔淨另以一

鍋盛熱水以此藥水鍋置其中隔水炖之限以熱不可過一百

四十度為式直煎至如糖水之稠即攤勻於厚玻片上或磁片

上乾成薄片即是藥也收取入樽

形色

色紅燂熱則變黑

氣味

味甜略澀經火燂發出氣

息如沙糖

溶化

水能溶化

凡水能化之鐵劑此屬佳品因其氣味純而易入口也

又與別等鐵類之藥能令大便結者不同服之胃亦無礙

服法 每服八釐半至三分四釐每日三服宜空腹為佳

鐵檸鹽 **製法**

檸檬酸 五安 鐵礞蘘 十二安上 清水 五安

先以清水化檸檬酸再以鐵礞蘘照上法做成鐵養溼散復將檸檬酸水燂熱限以不可過一百四十度為式到此熱度時則可漸次加入鐵養溼散加至不能化乃止將水隔淨用隔水鍋炖至如糖水之稠即攤勻於玻片上或磁片上乾成薄片即此藥也

形色 結片色黃能過光 **氣味** 甘澀 **溶化** 水易化化

得之水作櫻色 **功用** 平和清補最宜於小兒及虛怯

之人 **服法** 每服八釐半至三分四釐每日三服

鐵士的尼樟片

形色 薄片棕色 **氣味** 苦澀 **溶化** 伊打火酒不能化

冷水亦久而始化惟沸水方易化

功用 功同鐵劑及同金雞納霜能補血補腦

服法 每服二釐至一分 **主治** 婦嬰身弱血虛面白或胃

口不能遽受鐵劑等類者宜服之

鐵士的尼樟鹽 **製法**

鐵轉淡梅鹽八錢五分

士的尼八釐半

檸檬酸八釐半

清水一安士零一錢量

先以清水一安化鐵轉淡梅鹽，又以清水一錢加入士的尼、檸檬酸和勻，俟化盡併歸一器，勻和，照上文隔水炖法，限以熱不可過一百四十度為式，煎至稠如糖水，攤勻於厚玻片上，或磁片上，俟乾成薄片，即是藥也，收貯入樽。

形色

紅

氣味

苦

功用

助胃補腦筋，即鐵與士的尼之功力。

服法

每服一釐七，或三釐四，此藥有毒，切宜慎用。

鐵線水

製法

西藥畧釋

卷之三

調補門

鐵線水

輕綠酸

八安士量

汽水

八安士量

和勻

次將鐵線

一兩六錢

同入瓦

鍋慢火煎之

俟鐵線化盡

取出濾淨

復加入輕綠酸

四安士量

同煎

至發出紅煙

而該水變作

淡黃

之色

由是再將水煎去

至賸有十安士為度

然後加火煬之

煬至發出紅煙

而該水變作

淡黃

之色

由是再將水煎去

至賸有十安士為度

然後加火煬之

煬至發出紅煙

而該水變作

淡黃

之色

由是再將水煎去

至賸有十安士為度

然後加火煬之

煬至發出紅煙

而該水變作

淡黃

之色

形色

橙黃

氣味

澀

功用

補斂

內服外用

均能止血

服法

內服者

每次宜用五滴

加水沖服

外用

或以之射入肉瘡

令其血凝而結

自可化成實物

抑或

以療腿下迴管生大之症

亦可但此法每易壞人

未可妄

用

肉瘡破口

血箭

血痔

及子宮瘤破

噴血等症

即以此

藥水射入立能止血

每用鐵綠水五錢當以清水八兩調勻方合至醫者少

用此製鐵綠酒誠以該酒功用而尤勝於此也

鐵綠酒

用鐵綠水一

火酒三

和勻即此酒也

形色

紅黃

氣味

臭同鹽強伊打味酸澀

功用

補鐵

服法

每服十滴至三十滴加水沖服

主治

凡內腎膀胱患症係由虛弱而致者宜服小兒夜間

遺尿及婦人月經過多者宜服

方劑

一方

婦人行經作痛及患白帶者服之甚驗

鐵綠酒

八滴

鴉片酒

十滴

汽水

二兩或

和勻作一服每四點鐘服一次

通治

久患白濁經別藥而莫治者即以此酒及加些斑蝥酒

同服甚效內傷盜汗每服二十滴每日三服若外涂

潰爛疔能去腐生新割症或以之充止血藥亦可

鐵典

製法

幼鐵線 八錢 碘質 一兩 六錢 清水 三安 土量

入鍋同浸隨以慢火燻熱至水面浮泡變為白色然後取出

隔其濾出之水宜乘熱加入白糖 二十八 清水 十安 和勻由是

復用慢火溶化化畢貯入玻璃樽 此藥水有鐵劑及碘質功用

每服三十滴至六十滴須加清水調服

鐵絲鐵養水

製法

鐵綠水加入鐵 養再加輕養加至不能化爲度 製此
藥水要遵照西法用兩層盤器上層盤底以軟皮或豬小
吐爲之以到下盤之水面下盤盛滿清水日日換之或十
餘日不等以下盤之水吸至無酸味爲度上層器內之水
乃可用也

形色

棕紅色

氣味

無鐵質之味

功用

補血和別藥同服亦可

服法

每服可用五滴至三十滴

金雞納樹

此樹產南亞美利駕之山其山高約五百餘丈而

赤道之南二十度至北一十一度皆產有此樹近十餘年印度

西藥畧擇

卷二

調補門

金雞納樹

附一

山上瓜哇境皆種故出產日多金雞納霜等類乃采其樹皮製成者也其查得此樹皮有二十六種而可入藥者不過數種耳

辨別

藥肆所售者三種

一色灰白

一色黃

一色紅

白色者其厚自半分至一分每截長八寸捲作筒形味苦而澀但其苦猶遜紅黃二種若研幼則色略白黃色者二一形若捲筒其長自二寸半至八寸其厚自一分至三分一屬平片研末即作橙黃色味苦而悶顧平片者乃樹身之老皮捲筒者乃樹枝之皮是宜分辨蓋此種則較諸紅白者尤佳緣其中面霜殊勝也至紅色者味亦苦澀其形或作捲筒或作平片或破邊所賸該木長數寸

至尺六，徑約八分，或至四寸厚二分至六分。大抵白者內面先高，拏多於柱拏；黃者，柱拏多於先高拏；若紅者，則二質不相上下也。且該樹皮內函霜，計分四種：一桂拏

一先高拏，一桂呢咄，一先高呢咄。

形色

桂拏乃金雞納樹皮內所函白霜之一色白。

氣味

無臭，而味極苦。

溶化

冷水四百分方能化一，沸水二百五十分即能化一。若

油亦可化，惟伊打火酒化之殊易，但火酒所化者則苦甚。

考證

此物本蛤利之類也，與強酸相合可作鹽類，若合炭匿

酸及葡酸、惡西酸所作之鹽，則水、油、火酒均不能化，惟加

強酸少許方可化也

先高掣 形色 作珠色白 味苦

溶化 冷水不能化沸水二千五百分方能溶一若油及伊打

亦祇化些須惟沸火酒乃能化盡但化後而冷則仍凝少

許且伊打及油所化者入口苦甚

名數 緣此蛤利與酸相合作成鹽類而革去酸味也合鹽強

磺強及硝強光強醋強所成之鹽而水皆可化

桂呢喃 形色 與桂掣所賸之鹽及強水所賸之鹽相似

溶化 冷水千五百分能化一沸水七百五十分能化一濃火

酒冷的四十五分方能化一若係沸的三分七可能化一

先高呢咁

形色

恍同桂掣礪養乃製取桂掣所騰之水用

法製令凝結成珠者

功用

同桂掣礪養

餘論

顧先高掣輕絲及先高掣礪養其製法固易於桂掣礪

養而該價亦祇值其四分之一又况形色恍彷彿相同但功
力遙半若取以內服則照桂掣礪養倍用使得此誠為利
便之妙藥也近來先高掣輕絲先高掣礪養甚屬通行
即中國藥肆亦時有所售用藥者切勿因其價值相宜而
遂疑其功用不同也

參訂

昔人未諳用霜惟研此樹皮以作服劑其功用非不相
同但所服藥末必須太多則未免致悶故不若服霜尤勝

內身身

二

桂樹皮

桂樹皮

二

黃金錫樹皮

十一兩

輕綠酸三安

鑄養水八十

淡鹽水

足用

先將輕綠酸與清水

和勻

此即是淡

以該樹皮置磁盤

內將淡輕酸水浸少時撥轉令勻浸足十二個時辰用漏

斗以淡輕酸水過之過至此水無苦味為止加入鑄養水和

勻俟所結成膜傾去上面之水將珠放在布上下盛以器清

水淋洗至水無色

此珠即係桂聖呢叮等類另入在磁

盤內加清水十安士以隔水法炖熱漸次加入淡鹽水酸水

燻至珠將化完趁水煖用紙書隔隔後將其水煎至上面起一

層薄皮爲度俟其結珠隔紙提去溼汽及乾即是藥也然要將桂萼磺養及桂呢町磺養逐一分清殊屬緒繁法亦不一此不過略述梗概而已

形色

此物結槍珠色白淡強水化盡後一滴放玻片上乾作珠形有圖係用顯微鏡察出繪之

氣味

極苦

溶化

受熱至水沸之度能發光冷水七百四十倍能化一沸水三十倍雖能化一而冷則復凝火酒六十分可溶一廿油四十分能化一伊打酒亦略化少許惟淡強水化之殊易

辨

桂挈磺養一物，或有以別物攪入者，顧此物原身本面有少水，製時以二百一十二分熱焙去數分水汽，乃成是霜。若將其露置半旬，則每百分能食水汽二十八分有奇。此藥乾溼必不同功，在善用者神而明之耳。以霜秤準焙乾再秤，即可覈驗。此物恒攪鉅磺養，或別種鹽類，或樹膠及糖漿粉等物。

驗法

以霜入甌，加火煅煉，蒼真霜自可甌去，餘別鹽類不能也。或以火酒驗之，第見火酒能化霜而不能化粉及樹膠，倘雜蠟槍之類，而用水及淡磺強化之，則水亦只能化霜而不能化油蠟也。

能作補劑及可治瘧凡身體虛弱者宜服

服法

每服

二 三釐每日

三 四服

空腹服之其功勝於飯後

但未服之先宜預服瀉藥

宜忌

大抵此霜服少許未覺別徵惟脈則略數而快耳若多

服

至錢

則將頭困耳鳴喉悶或眼角火爛或語亂神昏服

藥者倘覺如此即應停止

相佐

凡服此霜而加入淡礬強少許功力彌峻若服藥覺

苦悶不能下咽則每霜一分七釐宜加入炭匿酸二釐便

不覺苦且此霜合鴉片青礬信石等藥同服尤見功效

主治

隔日瘧疾須於疾未起時先以此霜二分至四分數

次服每次服二

三釐至五

六

釐如無別症而只屬瘧疾者

必可十服十愈也

其或患瘧而兼肝腹有症者宜先服

吐瀉等劑後服是藥

倘服此截瘧而未獲效則兼服青

礬信石之類可也

截瘧之法

一於瘧疾未起前四點鐘每點鐘各服三釐連服

四次如或仍發下期照服當必獲效

一於該疾未作前

六點鐘連服四次每服二釐每點鐘一服至臨作之際再

以六釐作一服

一法

自熱退後起隔兩點鐘一服每服八釐或連服二次或

連服

三

次至耳鳴爲度如此自能止瘧倘有復發則照

此再服，無不應驗。然或依此服之，而仍有未愈者，是又當細覈該霜之真否也。瘧止之後，至第七日或十四日，仍須再服此藥，庶絕其患。若潮熱退後，服之亦妙。第須先服吐瀉藥，或表劑，方易奏效。症重者，每服八釐，間一二次，自鐘一服，連服三次。症輕者，每服四釐，亦連服四次。自可告痊。

方劑

一方 治瘧疾，宜於未作前，每四點鐘各一服。

桂挈礪養 三釐

葡萄酸 二分

清水 一兩

共貯一杯調

勻，鎔炭養 三分

白糖 五分

清水 二兩

另以一杯

開化，由是將二杯合而為一，當即作沸，但乘沸時，即宜內

服

丸方

桂掣礪養一錢
麪粉二分
糖水備足

先將桂掣礪養與麪粉和至極勻而後攪入糖水作丸五十粒如此則每粒固有藥霜二釐

又方 治瘧疾發熱後尚覺舌白口乾者宜服

桂掣礪養二分
迦路米六釐
鴉片末五釐

和糖水麪粉調勻作丸十二粒早晚各服一丸

又方 治同上

桂掣礪養二分
汞藍丸料二分
鴉囉粉二分

糖水和勻作九十二粒每日服三粒

又方療瘡

桂挈礬養三分 磺强水一滴 白糖一錢 桂皮水二

面和勻每點鐘服一酒杯甚妙

雜治

又方作補劑凡面黃胃不消化者宜服

桂挈礬養三分 青礬七分 清水一斤 和勻每服四

錢至八錢每日二三服

凡戒煙胃不消化宜服此藥水若無腹瀉則服之能益胃去痰補腦並除癩癧此誠為戒煙之妙藥也頭面腦筋作痛係屬有定候者服霜能截每用一分至半分數次

服、療內傷作補藥每服霜二釐每日三四服但須加

入青礬少許凡內傷盜汗胃不消化者服之最驗

桂掣雙礬養製法

桂掣礬養 加入淡礬養酸煎至水乾結珠

形色 三角或似針能過光 味極苦

溶化 火酒兩份化一 冷水十一份化一 隔水鍋炖可以

炖溶

老礬 每百份內有桂掣六十份

桂掣輕綠製法

淡輕綠酸燂煖加入淨桂掣加至酸味解盡為度

形色 結珠白色恍似星之光芒 溶化 凍水廿四份化一

火酒三份化一 哥囉方九份化一

桂挈醋鹽 製法

桂挈醋鹽 分十七 鎬醋鹽 六分 熱水 足用

先將熱水化桂挈醋鹽加入鎬醋鹽俟凍結珠傾去水將珠用法焙乾 形色 長而似針潔白 溶化 冷水難化沸水及淡強酸易化

考覈 此珠每百份內面桂挈八十四份

桂挈燐養 製法

煖燐養熱水化淨桂挈所結之珠白色極幼

西藥畧釋 卷三 調補門 桂挈醋鹽 桂挈燐養 七

桂掣沙礪先

製法

桂掣輕綠

輕淡沙礪先

以清水和勻俟其凝珠即桂

掣沙礪先也

溶化

水二百二十五份可能化一濃

火酒二十份即能化一

功用

同桂掣礪養

桂掣信養

製法

信養酸用沸水開化加入淨桂掣至不能化為度凍結珠

形色

長而三角

溶化

冷水化少許熱水易化

桂呢叮礪養

形色

珠細而白似桂掣礪養

溶化

冷水

三百五十分能化一

濃火酒三十二分能化一

功効

治病服法均同桂掣礪養該價祇值其半

先高呢咁磺養

形色

白 味頗同桂挈磺養 一溶化 冷

水一百份能化一 火酒能化 功助與桂挈磺養同價

值祇三分之一治病服法亦同

桂挈炭匿 桂挈檸檬 桂挈葡散 桂挈淡養 桂挈鐵炭

淡 桂挈甘松 桂挈磺加播匿 桂挈安息 先高呢填沙

泐先

右各種桂挈鹽類西國藥肆雖有發售究非通行之品因桂挈本屬蛤利類合酸類便可成鹽其功力在桂挈不關乎酸類也茲特表而出之以便後學得有考云

瓜沙

此樹產南亞美利駕及西印度等處樹高四丈或八丈

西藥畧釋

卷三

調補門

先高呢咁磺養 瓜沙

大

身徑一尺或二尺半，入藥取其木，泡水而用。彼藥肆所售者，多橫鋸作片。

形色 白而黃 **氣味** 苦而臭

功用 開胃補身。凡虛弱神氣不足，胃不消化，及病後無熱者，服之均妥。惟不能取以治瘧耳。

服法 每服一錢，即以水一碗泡之，空心服。誠為通行之品也。

西國嘗將此木雕杯，內貯清水，俟浸半點鐘，藥味發出，而取以內服，功用亦同。
且此杯可以久用，不
變，誠別具妙法也。

龍膽草 此草高約三尺，產歐洲之南及中國齊胸山谷等處。

以根入藥用。色黃，味苦。

功用 補身開胃內服則用水泡酒泡俱可

方劑 一方 療治功用與瓜沙同

龍膽草 二錢 柑皮末 五分 八角末 五分 火酒 二兩

清水 六兩 先以火酒浸此三藥約兩點鐘久然後將水

加入濾淨每服四錢至八錢

製龍膽草膏法 龍膽草粗末 十二兩 清水 備足

先以布鋪路器上而後置藥於中隨以清水淋之淋至該藥無味為止由是將水煎沸再濾然後入釜熬煎為膏每

服一分至三分

作丸方 用龍膽草膏 大黃末 番礬 各等分即以龍膽

草膏加水和勻為丸每服一丸凡身弱胃不消化者

服之甚驗

加林簞 此藤類也產亞非利加之東入藥取其根用

形色 根形頗圓彼藥肆所售者多橫鋸作片該片則有團團

圓紋環繞其圓紋則自大至小自厚而至薄且近皮處復有一黑圈濶約

五分至二寸半厚約一分至三分若片之外皮則厚約一

二分也該片色黃略綠函有微漿而無炭酸之雜質用

水泡之加入碘酒即變藍色

氣味 苦而微香

功用 補身開胃 服法 取片研末每服宜用一分半至四

分

方劑

一方

加林箏片

四錢

清水

八兩

約浸一點鐘

濾淨每服一兩日服二三次但此藥水不宜久貯須隨製

而隨服若用以熬膏宜倣照製龍膽草膏法

一方治胃不消化腹痛

加林箏

八錢
研末

柑皮

四錢

太和酒

一兩
六錢

清水

十一兩

共浸十二點鐘濾淨每服八錢若大便秘結則加入大黃

末一錢可也

介利大

此樹產印度高約二三尺入藥則取其全樹而用藥

肆貨者多細成一紮

形色

氣味

苦

功用

補身開胃在印度最爲通行之品也

服法

取以研末每服宜用三分

方劑

一方 介利大二錢切碎 煖水八兩

約浸半點鐘

淨每服一兩或二兩每日兩次空心服

黃連

生巫陽川谷及蜀郡泰山之陽樹高尺許取根入藥

形色

根色外棕內黃

氣味

味苦無毒

功用

與瓜沙龍膽草同凡身虛胃弱者用以療之可也

考訂

時珍本草誇其並能療治各症誠未必然也

郁李皮

此樹產美國及中華河南山西甘肅等處樹高二三

丈入藥則取樹根之皮而用惟外面粗皮仍宜刮去庶爲合用

形色

棕紅

氣味

苦香，臭同苦杏仁，研末殊易

功用

補身平腦，病後欠補，尚有微熱者，宜服之

方劑

一方

郁李皮

四錢

清水

十二兩

約浸半天，濾淨，每服半茶杯

又

方

治久咳內傷

郁李皮

四兩

卽以清水潤之，入罐蓋密，俟過廿四點鐘而

後，倒入路器內，略爲壓實，由是加水淋之，淋至有十六安

士爲度，濾淨，入罇，再加白糖

二十八安士

和勻，俟其溶化方可

內服，此藥水香甜可口，每服一酒杯

柳樹皮

此樹中外各國隨處俱有，高約一二丈，入藥則取其

樹枝之皮研末而用 形色

氣味 苦澀微香

功用 補斂開胃 服法 每服藥末五分至一錢

主治 凡身弱胃不消化者宜服 久咳痰多者宜服

作藥水方 柳樹皮八錢 沸水十二兩 和勻濾淨每服一茶杯

取 此藥內面有沙利先藥利先一物狀略如金雞納色白味苦酸勁永與大酒同煮消化 用法取出功

力尤峻 用以療瘧宜於疾未作時每服八釐連服六次

自能奏效

玉桂 此樹產粵西安南等處取皮入藥色棕黑味辛甜

功用 補斂若入補劑可止痛治氣臟亦有取其味之香以佐

別藥氣味也 蓋桂皮內面有油及炭匿酸二物若去此

二者即全無功力用藥者宜知也

方劑

一方

玉桂末

一兩六錢

薑末

一兩六錢

荳蔻末

八錢

八角末

八錢

和勻每服分半至五分

玉桂酒方

療腹痛氣脹

玉桂粗末

八錢

八角

四錢

乾薑

三錢

淡火酒

一觔

浸十四日濾淨每服一二錢

作藥水方

玉桂油

三十滴

鎂炭養

一錢

汽水

半觔

先將鎂炭養與玉桂油和勻然後加水攪勻此藥水恒以

和各方劑甚為通行

丁香

此藥產中國東南洲島蓋取其未放之花而用也

形色

氣味 辛香

功用

補而去風宜合他藥同服或取助別藥功力大抵丁

香一物內函有油

功力在油宜用法取出

方劑

一方 凡身弱胃不消化者服之良

丁香

二錢

沸水

八兩

浸半點鐘濾淨每服一兩或

用丁香油

三

滴沖水服亦妙

雜治

婦人胎前作悶服丁香水即能止嘔每服五錢至一兩

牙痛有枯穴綿蘸此油塞入而痛可止

水菖蒲

此物產美國歐洲印度及中土等處，蓋草類也。每向

水溼之處而生。其根頭大約五分長，約數尺而形狀則似分數截而實相連。由根頭而發葉，該葉闊約八分，長約二三尺。入藥用根。

形色

色白根下復生多莖。氣味 臭微香，味略苦辣。

功用

補身開胃，止腹痛，治氣嗽。此藥頗通行，恒合別藥作

補劑。服法 宜研末，每服分半至三分。

方劑

一方

水菖蒲根

一兩六錢，搗爛。

沸水一觔。

浸半點鐘，濾淨，每服一

兩。

考覈

此藥功力不外根之油，若歷久則該油洩去，恐不堪

用也

陳皮

此樹產中國及印度呂宋等國，入藥蓋取其果皮而用

形色

氣味

臭頗香而味略苦辣

功用

助胃消化，治腹痛及去風。此物宜合他藥同服，並能

助別藥功力

考覈

但陳皮一物，以內尚面有油者，方能行血祛風，補胃，否

則該油全行洩去，而功力亦減，此又不可不知也

方劑

一方 開胃止腹痛

陳皮絲

二錢

生薑、檸檬皮

一錢

丁香粗末

五分

沸水

八兩

共浸半點鐘蓋密浸畢濾淨每服一兩每日三服

乾薑

產粵東四川等處

形色

氣味

辛辣

功用

作補劑能療血滯身冷等症入鼻則能作嚏入口則

令喉熱生津液入胃亦能令肉皮發煖行血

服法

研末每服一分半至三分

方劑

一方止腹痛氣臌

乾薑

四錢
搗爛

沸水

十六安
土量

浸半點鐘濾淨每服一二兩

宜乘熱服或輕痢症服此亦效

考訂

查此物除治腹痛氣臌而外甚少獨用大約多偕別藥

而作補劑也

薑酒方

乾薑

二兩

火酒

十二兩

浸濾每服十滴至四十滴

宜用煖水調服

凡輕痢症服此良

餘論

或以薑入瀉劑亦妙蓋能止瀉藥之烈並可免瀉時腹

痛至若以薑搗爛外敷則詳見下文引灸法也

銀橫齋

此藥製法形色氣味已詳上吐藥篇

助瀉

若用作補劑每服釐半至一分但須由漸加多庶免

悶吐此藥初服不甚見效惟服至數旬乃能開胃補身益

腦及治抽搐

此藥治一切虛弱等症如服此藥後覺腹脹二分者即服此藥則愈也

方劑

一方

補虛弱等症

錐磳養一分七釐

沒藥一錢五分

和灰麪糖水共作丸二十粒

每日服三四丸

一方 治胃不消化

錐磳養一分七釐

每日分三次服

又方

錐磳養三分

鴉片末八釐半

和米餲作丸六粒飯後服

一二丸服至數日後將方內鴉片減去加入硫磺末或龍

膽草膏作丸照前再服彼身弱胃不消化及有風在大腸

之間者服此最驗

一方 錐磳養二分半

龍膽草膏一分

和糖薑汁作丸二粒每日早晚各服一丸可治羊癇等症

若以此藥療癰則功同信石也

銀淡養

即硝強銀

製法詳化學初階

形色

結珠大而過光

氣味

苦澀

溶化

水一化一沸火酒四方能化一

洗膜

但水所化者皆全質皮肉即變黑色難脫而

棉麻布線之亦然惟先以鹽酒清之次以銀銀水滴上然後復以鹽水揉之方可脫去

法

成條

硝強銀受熱至二百一十九度即能化液而可入管印

成條子受熱至三百一十五度則壞不堪用故煅時最宜

小心

辨別

內服宜用其珠作條子者勿用蓋恐其內含雜質也

功用

補腦

主治

凡抽搐轉筋、胃不消化、肚痛、嘔酸及腹

瀉、羊癇等症

服法

每服半釐至二釐

此藥固須服至月餘方獲功效

然連服至

八天

又宜暫歇改服瀉藥

三日

方可再行

續服且此藥不宜過服否則壞人誤服者須食生鹽水

解之

方劑

一方治小兒腹痛

硝強銀

一釐半

淡硝強水

五滴

粥水

六地

糖水

六地

和化每服一錢每點鐘服外治詳下文

硝強銀

此即硝強銀也內服宜用淡硝強水及硝強香酒二

西藥畧釋

卷二

調補門

硝強銀

三

種

卷二 淡礬強水 礬強香酒

淡礬強水

製法

礬強水 三安七量

汽水 三十五安七量 或用雨水亦可

須由漸相和

形色

似水無色

氣味

略酸澆

服法

每服 一二十滴以水冲服

礬強香酒

製法

礬強水

三安七量

火酒

四十安七量

桂皮

一兩六錢

乾薑末

一兩

先以火酒由漸與礬強相合然後以薑桂粗末入浸七日每日攪動俟過七日濾淨

形色

淡黃

氣味

酸香

服法

每服五滴至十五滴

功用 補胃除痰退熱止血並治鉛病腹痛

主治 身弱胃不消化 內傷盜汗或服歲服 疔後體弱或痢症

服之能補 吐血及大腸便血肺經咳血婦人月經過度

服之皆可療治 鉛病腹痛宜以濃礞强水調 汽水一

和勻每日服此水三 每觔分數次服輕症者服三四

日重症者服五六日甚驗 一法 服此藥後隨將衣服

卸去坐在透氣椅上其頸脖之下以衾圍覆而椅下則焚

磺薰之如此則鉛病尤易愈也 泰西鉛匠恒服淡磺强

水故鮮發鉛病

雜治 砂淋症以草藍紙覆得非由酸者宜服 瘡疥及皮膚

等症宜內服兼外塗

淡養酸

此即硝強酸也入服劑應用淡者

淡硝強水

製法

硝強水

一安士量

汽水

六安士量

調勻

形色

純清如水無色

氣味

酸嗅之刺鼻

功用

入補劑與淡硝強相仿

病後欠補者宜之

服法

每服二十滴至四十滴

雜治

砂淋症係非由酸者亦宜服

疔毒骨痛鼻有透癰者

每日三服

膀胱積熱而流涎如白濁者宜用淡硝強

滴

汽水

一安士量

和勻以水節射入尿管少頃可旋放出大抵

始則宜兩日射一次繼則每日射一次甚驗

若癰肛門

流血又宜以濃硝強塗之

至於用以作丹則詳見下卷

輕綠酸

即鹽強水

製法

鎬綠

四十八安土秤焙乾

磺養酸

四十四安士量

清水

三十六安士量

先以水三十二安士將磺養酸由漸和勻俟冷放入膽瓶

該瓶以能繫十六

為食然後加入鎬綠由是復設玻璃樽兩箇一用三口之樽宜列左

一用一口常樽宜列右大抵三口之樽須將所贖之水四安

士納入樽中其左右兩口均以通心木柱塞之

其樽口以通心木柱塞之其樽口以通心木柱塞之其樽口以通心木柱塞之

中間一口則以玻璃插入合其略為容水

容水為容水之樽也其樽口以通心木柱塞之其樽口以通心木柱塞之其樽口以通心木柱塞之

至若一

口常樽宜內貯汽水

五安

仍以通心木柱塞口

各器既備即

將膽瓶之嘴插入三口玻璃樽左便之口其餘右便之口及所貯

汽水玻璃樽之口，則另用一彎曲玻璃管插入兩處，蓋欲其互相通氣也。佈置停妥，即向膽瓶用火燭熱，令藥氣先透過列左之樽，然後透至列右之樽。藥氣此樽系以全五分機大概俟經製之水，約共有六十六安士，即可成為輕綠酸也。得此製藥之所而所製之酸，用法非常，及要前是是也。製成後，宜用玻璃樽貯密，若露置，即有黃煙上升。

形色

此水新製清而無色，歷久則變淡黃。

氣味

酸嗅之刺鼻，倘變壞則臭味酸辣，殊不堪嗅。

功用

能作補劑。主治凡病後身弱，內傷盜汗，胃不消化，

及患疔毒等症，服之均驗。

作淡鹽強水法

鹽強水一安士量

清水三安士量

和勻，每服二十

滴至六十滴加水冲服能補氣血

外治

或因體弱而生瘰癧或因疔毒而致喉爛均宜用此藥

水搽之

一方

鹽強水

一地廉或二地廉量

清水

十二安士量

並加白糖少許和勻用以漱口而喉症可治

皇強水

製法

先以硝強

一安士量鹽強

兩安士量

相和後將汽水

三十

安上量

加入和勻隨用綠玻璃樽貯密

形色

櫻紅色

氣味

酸刺鼻濃者起黃烟

功用

能作補劑

服法

每服十滴至二十滴

主治

久患肝症及患疔毒宜以少許加水冲服

外治亦頗

有效

目錄

卷三

三

三

三

論行氣血之劑

夫能令心脈發力先自內腑而遞及遍體者卽謂之行血氣劑也顧所謂氣者非屬呼吸之氣乃指腦氣而言蓋行氣之藥本先入血而令血行彌快及令微絲血管受血亦多此所爲通身發煖而行氣卽並行血也大抵此藥略同補藥所判者補藥則由漸而令身體康健此藥則驟然而令氣血通暢耳故補藥每日宜服二次此藥每日宜服數次或每點鐘服一次誠以此藥發力雖速而要不免旋發旋散故必須頻服而方獲功效也但此藥雖能令氣血流行而究之力渙之後又將反成困憊故亦不可常服譬諸飲酒少飲則能令血行快捷而各臟功用亦

覺爽利惟過飲則反以貽害耳

酒時有以酒瘡局而致不飲數日者此病者愈後而自誤過之也

由是觀之服

此藥者正宜合度

功用

氣虛血弱宜服

病後體羸宜服

行役勞苦跌打損傷宜服

中毒或被蛇傷宜服

腦病譫

語由於孱弱者宜服

至若臟腑發炎及身有熱者則忌服也

電氣

夫電氣能隨筋絡運行意與精神相類此所以實能療病也。顧電分乾溼其用強水而發者則爲溼電其用磁石而發者則爲乾電雖功用彼此相同而要以乾電較爲易用。

製造

電氣箱製造不一而其中則均有陰陽二線每長約二

三尺線之末則有柄其柄有製爲實心者亦有製爲通心者若屬通心則宜以溼海絨納入其內令電氣易行以此震動患處尤爲應驗且該柄花樣甚多凡用以入目入耳入鼻入口與夫入前後陰等處者均皆巧妙蓋西土所論電學極其詳晰今則愈求而愈精此不過言其大略耳

用法 用以療症則令病者執其二柄而一經電發自能震動

通身又或執其一柄餘一柄則任向身上患處而以電氣

震動亦妙

功用 能行氣血

主治

初患風癱約震二三月可愈

但患此症者非是癱瘓藥酒及時常伸動手足麻者非癱瘓之腦受風者能治也

產後膀胱大腸失厥功用大小便閉 凡眼畏光或目發

青光者或月經不行而服藥罔效者 溺積膀胱而致

脹滿者均宜用此震之 未產血流既產血溢即以此

法震其子宮而血自止 久患腦氣筋痛問或可愈 氣

喉之筋或有變壞而致口不能言者宜以電氣震之一線

入其口內一線震其頸後 耳聾先入以水隨用電氣震

之一線入其耳一線震其項但須徐徐震動並勿過久

鼻失功用亦宜療以此法 胃不消化又宜以一線震其

胃部餘一線則向舌上或頸後震之大約療至數月方獲

功效 誤服鴉片先用藥令吐出隨即震以電氣可獲安

痊 救溺水則先去溼衣易以煖衣隨發電氣震之奏效

甚捷 割症異法 法將鉗金線先置患處隨發溼電傳

之令其發熱由是乘熱而即以此線割症則較之用刀更

爲奇妙

番木鱉

名馬錢子

此樹高二三丈產印度安南小呂宋及諸海洲而

樹身樹根其味皆苦果大如橙皮黃而硬肉有汁液並函多核

土人用以療瘡多取其核

形色

該核面則凸而底則凹厚約分餘徑約五分且全身有

灰色之毛厥色光豔毛連有皮皮內即肉肉硬而韌碎之
不易色頗白而略過光恍如明角亦間有色稍黑不能過

光者也

氣味

核肉無臭味辛而苦

釁取

清水能提其功力淡火酒浸提尤佳此物內面植物之

霜二種一土的年

鷓鴣一布老時亞

考訂

古時印度亞刺伯醫士雖曾以之入藥而要未洞悉其

品惟自嘉慶二十三年有法國名醫不加二氏悉心細覈

然後深知其妙用，即在此二種內也。

功用 能行腦筋肉筋脊髓，使之發力。

主治 風癱、膀胱癱、膀胱口癱，或小便不利，或不能忍溺自遺。

均效。惟腦部有炎者，須去清方可服。

服法 以子作散。得此物，即欲研末，須先將藥別，藥末取出，燒乾，再研力成幼末。每服宜用三釐，每日三服。

方劑 藥酒方

番木鱉散。二安士秤 火酒。二十安士量 用以作酒，宜照上文製。

路卑利酒法。此酒功用服法 每服五滴至十滴，能補身。

每服十滴至三十滴，能令腦筋肉筋發力。

方論 此藥少服則補而利小便，服略多乃入肉內之腦筋而

令肉筋發力也凡內服此藥始則四肢覺重漸則軟弱微
癢而並覺頑木若多服則恒自驚戰亂其方寸久服則尤
慄慄顫跳不能自已甚至肉筋或有抽搐莫能復鬆腹熱
如焚喉忽緊窄而呼吸吞咽均覺窒礙由是或頭昏或眼
蒙瞳人縮小皮覺針刺皆在所不免惟脈則無甚變動或
略快些耳要之此藥高下不一品質參差故西醫多捨
是而用士的年也

士的年

此藥即番木鱉之精也藥性酷烈毒極有非他藥所

能擬者

服法 每釐須分作十服或八服

戒慎

以飼巨螯未及一釐而立斃人服釐半亦即傷生

功用

能療全身風癱及膀胱癱症惟服藥須由少漸加不宜

躁急若既服數日又宜暫停且以此療四肢癱症數服後

則受病處必先覺微驗誠久服之自可由漸發力惟半身

不遂及因腦髓脊髓受病而致癱者服之罔效且該處倘

若發炎服之反以增害眼矇係由腦筋孱弱而致者服

之宜若眼內腦筋已壞服亦罔濟腦筋痛服他藥而弗

驗者服此些少間使奇效腦裏思慮過度及身弱者服

此可作補劑服法宜以一釐分二十次服

方劑

藥水方 此藥水每一安士宜分二服或三服發腦筋

力

士的年珠 四釐 淡鹽強水 六滴 火酒 二地 清水 六地

廉 先將清水 四地 和鹽強水煙熱以鎔化士的年隨將

餘水及火酒投入後再加清水 十五安 和勻

通路度先 即後編 此樹產印度入藥用其果核蓋該核內面有霜

用法取出其霜甚醫者慎毋妄用 彼人嘗以此作鎮魚

功用 能入腦祇宜外用不宜內服倘誤服之大有筋抽之患

形色 氣味

方劑 一方 用此核 一錢三分 搗爛 豬油 八錢 和勻搽之

能治頭癬及殺頭蝨

了葛 此另一種麥子與小麥不同未變壞時粒不甚大已壞

了葛



每粒長約四分

至一寸二分闊

約一分至分半

形色

每粒均有深紋該紋有二質頗脆色外棕黑而內灰白

氣味

氣息別成一種味頗苦辣

考覈

此物內面有油及面有二精一名了葛頭一名士加利

亞而功力即任了葛頭也

功用

專行脊髓及自和腦根故能令婦人臨產子宮發力

用以節射入皮止血亦妙

主治

凡臨盆乏力者或胎衣不下者宜服但胎兒橫生及子宮未開兒頭未落者忌服服過甚之宜慎

或產後或小產子宮流血服之能止 閉經服此亦

或可治 凡鼻血咳血大小腸流血內腎流血等症服之

皆驗 凡大人小兒或日間或夜裡溺急即遺不能忍而

者服之可愈 遺洩者亦效

方劑 製了葛酒方

了葛 五安土 粗末 火酒 二十安 土量 製法同上文路利酒方

每服十滴至一錢

了葛水製法

了葛 十二兩 搗爛 伊打酒 二十安土 或足用 清水 七安 火酒

八安 士 先將伊打酒放入樽內加清水十安土攪勻少頃

又將伊打酒取出祇留清水旋將了葛放入漏斗卽以伊

打酒逐少緩緩漂淋之

因伊打酒能去葛所聖油

取出了葛用器皿以清

水六十安士浸之照

二百一十二度

表燂至一百六十度之熱

浸十二點鐘攪盡了葛之水用隔水法炖之至賸水九安

士爲止俟凍加入火酒八安士約歇一點鐘濾隔淨要得

藥水十六安士爲式

此藥水每服三十滴至一錢可令

子宮發力每一點鐘服

三四次

又方

了葛粗末

新采者二錢

沸水

十安士

浸半點鐘每服半安至

兩安

一方 止咳血

了葛水

三安土量

衣畢格水

半安土

鴉片酒

半安土

和勻，每一點鐘服一錢，血止停服。

一方 節射入皮，止血溢甚捷。

了葛水

一錢

甘油

一錢

清水

七錢

和勻，每次用十

滴至二十滴，節射之。凡遇血流不止，危急之時，用此法

勝內服也。

粟米了葛

粟米變壞，恍同上文變壞之麥，故亦名之。

功

皆同，不必再述。

毛地黃

西地液連

出處形色氣味已詳上文，利小便篇內，茲論其平

脈功用而已

功用

平脈

主治

凡心經有壞而致血不流行，眼蓋略腫

面色發紅，脈數氣緊，服此均妙。婦人月經過多，宜服

內傷服之，雖不能愈，亦可止喘寧睡。

服法

以葉作散，每服二釐至四釐，每日兩服。

方劑

藥酒方

毛地黃葉

二兩
搗爛

淡火酒

二十安
土量

製法宜照上文路卑

利酒方，每服十滴至二十滴，每日二三服。患心症者服之

可治。

一方

地治低連

三釐

先以火酒化之，後加糖水十六安土

西藥學譯

卷三

行各藥及和藥簡

毛地黃

三

和勻每服一錢如此則是藥性燥而分四服也每日三四服

顛茄

此樹產歐洲美國等處高約三尺所結之實狀如李子

中有多核

形色

始則綠色漸則紅色迨熟時則變為深紫

之色

考覈

此樹全身皆具功力而人藥則多取其子及花葉搗漚

熬膏或以酒浸漚煎作膏

氣味

功用

提神寧睡

服法

用此膏者宜以一釐分四次或分兩次服甚驗若以

葉作水始則宜服釐半由漸而加至三釐亦妙若氣喘

作時宜以一釐分八次或六次服每點鐘一服

宜忌

但此藥不宜過服，否則喉渴目眩，頭昏或如沉醉，而輒易傷命。他如蛤利類及鐵劑，能敗此藥功力，又不可同服。

顛茄膏製法

新鮮顛茄葉及嫩枝

二百五十磅

用大石臼搗爛，搾取

其汁煎至一百三十度之熱

（沸點）

以綿布濾淨，隔水鍋

煎去水汽，煎至糖膠之稠，將初次青色渣放入再煎，用木

片不住手攪勻，煎至僅足一百四十度之熱，便可，不可過

此稠至可以埋丸為度。此乃英國通行之法。

製顛茄酒方

顛茄葉

八錢

淡火酒

二十安士量

倣上文路卑利酒製法

西藥格釋

卷三

行各藥房和藥舖

顛茄

三

每服十滴至二十滴

一方 治氣喘

顛茄酒

三地廉量

鈹鐮

三分四釐

鈹炭養

一錢七分

清水

十六安士量

和勻每服半安士日二三服

一方 腦氣筋痛

顛茄膏

四錢

鴉片末

六分八釐

豬油

四錢

玉桂油

六滴

調勻外搽即效

又法 先服瀉藥後用顛茄膏三釐分作三服每點鐘一服

俟其痛止每日用一釐分早晚午三次服自可告痊

餘論

要之此藥功力而有如是之峻烈者實以其內函有了

刀邊也

了刀邊 此物以顛茄根製煉而成，蓋用法取出其霜也，功同

顛茄而力尤猛，製法

顛茄根末 三十八兩四錢 哥羅方 三兩六錢 火酒 淡礬強水

鈹養水 清水 各宜備足，先以火酒 十六安士量 浸藥末，隨

置漏斗濾隔，復以火酒淋漂，淋至其濾得二百五十六安

士為率，由是將此酒入甌，以甌去一百九十二安士為度

其餘甌內所存之物，加入淡礬強水，隨以草藍紙覆之，至

略成酸味，而再入甌，至賸有八安士，即加清水八安士

沖和濾淨，乃將哥羅方 一兩二錢 加入，復投以鈹養水，至成蛤

利味即酸味敗盡也於是頻頻攪動，歷半點鐘許，放定，令水分為

上下二層，然後用酒角將輕清者提出，提出後再加入嚼

嚙方一兩二錢隨即攪動，俟其凝定，再分兩層，則亦將輕浮者

提出，其餘尚有嚼嚙方一兩二錢盡行加入，頻攪放定，俟分二

層，仍將上層輕浮者提出，至於下層三次所騰重墜之水

宜合貯於大磁碗中，令其陰乾，迨乾後，爰將碗底之散取

出，即了刀邊也。

形色 所結珠恍似三角槍形，純者色白，用上法製成者，色微

黃。

氣味 無臭，味苦辛。

溶化 受熱至九十分則成液受熱至一百四十分則可甑然

受熱而至此亦已毀敗過半矣

功用 能行腦氣筋療眼各患

主治 眼科欲作假瞳人或炎症而必須亟散瞳子者均宜用

了刀邊開水滴人 明角罩生炎粒而洞穿者須以了刀

邊水外差令其開散瞳人蓋此症眼簾恒粘窠穴其後每

失舒縮功用也凡欲散眼之後房各症應用了刀邊散開

眸子庶易用鏡觀察 睛珠起膜或針或割亦宜用此藥

也 用了刀邊入眼法先以此藥水蘸紙眼乾將紙裁作

小塊貼入睫內此法亦可用顧或謂眼液不能化紙貼後

仍須將紙取出，不若以樹膠作薄片，而蘸了刀邊水入眼，是殆比紙尤妙也。

方劑 藥水方 療眼各症。

了刀邊 六釐 火酒 一地 廉量 清水 七地 廉量 和化藥水一清

水四滴之。

又方 塗治腦氣筋痛。

了刀邊 一分三釐半 火酒 三十滴 豬油 八錢 攪勻作膏

又方 治同上。

了刀邊 一分七釐 豬油 四錢 攪和以荳許搽患處，每日三

次其痛自止。

方論

此藥功力甚峻，雖以極少入眼，亦能令瞳子散大。昔人療眼症，多用顛茄膏。及其根，惟今時精益求精，乃知用了刀邊也。藥性毒而烈，入服劑最宜小心，或以此藥調水射入皮裏，亦可奏效。

佛茄兒

此樹產歐洲、美國及中華等處，高約三尺，每年換生一次，恍若鬧羊花也。所結之果大如李子，外有莢而內無肉，惟函多核，入藥用核及葉。

形色

核小如粟，色棕黑。

氣味

嗅之昏悶。

功用

同顛茄，能提神寧睡。

用法

凡氣喘症，每服此藥酒三十滴，加水調服，或用乾葉作

煙燃吸每次三分亦間有獲效者不妨試之也蓋此法有立能止喘者亦有不能止喘者

者惟見效則吸之否則勿用顛狂症服之亦驗久患風溼宜搗鮮葉敷患

處或用葉和豬油熬膏塗之俱妙

方劑 藥酒方

佛茹兒核二兩 搗爛 淡火酒二十安 土量 倣照上文路卑利酒

製法 此酒每服三十滴每日二三服

藥膏方 用此核十二兩 搗爛 伊打酒二十安 土量 火酒清水並宜

備足先將伊打入罇加清水十安 土量 撒勻放定俟伊打酒在

上而清水在下隨將伊打倒去別罇餘水棄之由是用一

漏斗插入罇口即將該核放在斗內而以伊打酒徐徐漂

淋令其食出核內所函之油，旋即將油及伊打倒去，倒畢，插回漏斗，另用火酒淋之，令其提出此藥功用，然後復將火酒煎去，煎至無幾，又宜隔水煎之，使其慢慢去清，方安其餘所存者，即成爲膏也。此膏每服一釐至三四釐，或用以作丸內服，或和豬油外塗，均妙。

方論

若用葉而服至三四釐，則脈略數，頭略昏，由是通體發煖，而面與手亦旋發汗，抑服葉而至八九釐，則能令人醉，身略發熱，語多含糊，甚至瞳人散大，作渴作悶，小便發多而大便亦相隨而出，至若服至過多者，則尤覺語言顛倒，而恍如沉醉也。

開羊花

此樹中國泰西均有產焉，高二尺至五尺，每年換生

一次，若開花結子後，而該樹旋即枯萎，俟至下年，則又由新種子而發生也。該樹全身皆具功力，而醫家所恒用者，則多取其葉與子。

形色

子有胞衣，衣有多刺。

氣味

嗅之昏悶。

功用

提神、止痛、寧睡。

服法

以葉作散，每服三四釐，以子研末，每服一釐，用子熬膏。

每服半釐至一釐。

若既服鴉片而仍未寧睡者，服此即

驗。

主治

癲狂症，應用寧睡劑者，服此尤效。

氣喘症，即以焦葉

燃吸作煙，每日三四次，問亦獲效。久咳無痰者，亦宜用。

之。眼科欲瞳子開散者，宜以此藥膏乃其字所和水外搽。

外治

疔毒、風溼骨痛，以此藥蘸酒敷貼。外加布帶纏紮一方用。

此藥末一分，豬油四分，同煎攪和作膏，用以外塗甚妙。

方劑 藥酒方

開羊花葉二兩 淡火酒二十安士量 做上文路卑利酒製

法 每服八滴至六十滴

又法 用乾葉分半至五分，作煙燃吸亦妙。

慎用 服此藥後，若覺頭昏、喉渴、目眩，即宜暫停。此藥不宜

多服，久服，否則眸子散大，眼花神亂，及頭昏痛，或致沉睡。

而死

樟腦

此樹產日本及中國廣東臺灣等處樹高而大凡木葉

皮均有樟腦之質以木作片浸甌可成樟腦然此猶未淨也

製淨珠法

用樟腦

五十兩用新炭而末過水者方合

和勻而以圓鐵鍋盛

之

此鍋須用全身的深手潤為尼

鍋上並設鐵蓋

此蓋須以薄鐵為之

蓋中預開一孔孔上復

用

一小鐵帽

形狀恍惚帽亦須用薄鐵製成

蓋密由是將此鍋坐沙釜上

釜以須預貯水

下用慢火炙熱至鎔合樟腦升上鐵蓋及由蓋孔而升至

小鐵帽內如此可成淨珠凡入藥分兩均以升淨而論彼

潤有雜質者慎勿濫用

形色

色白

氣味

臭烈氣味自成一種

溶化

水不能化惟火酒可鎔其味辛質勦如人火酒數滴方易研末大抵濃火酒每觔能化十二兩之多若樟腦酒而入以少水旋即變白恍如牛奶各淡強水及伊打酒油均能化之惟濃強水能敗是物

功用
服驗

初服能令腹之內皮發熱其後則人腦而壯腦力間或發表惟不至令脈洪數耳大約服一二次則能平腦安身

戒慎

若過服則壞人

最壞處始則作吐繼則神昏達至不醒

宜慎用之

炎熱症忌服

主治

凡轉筋症服此最驗但須先服涼劑而後服是藥方妙且身弱而四肢不安者宜服月經不調及酒醉過度者

亦宜服

外治

至以酒調化

或酒亦可

外擦風溼頗獲功效

嘉薦
片酒蒸

神昏作悶，嗅樟腦，或樟腦酒亦妙。

服法

凡以此藥療症，每服八釐至分半，人服劑用酒化，或以樹膠沙糖和樟腦同研，加水調服，但此法調水後，而樟腦之質恒旋自墜，惟於研時，加沒藥少許，則調水可略經久。

方劑

一方 樟腦水製法

樟腦

八分

先以火酒少許和研，再加入鎂炭養

一錢

然後

徐徐加水，和之，至藥水共有十六兩為度，每服一茶杯。

樟腦酒方

樟腦

三兩
二錢

火酒

三十二
安士量

和化，每服五滴至三

十滴，但此酒多用以外擦風溼跌打等症，甚少內服。

一方 凡風溼骨痛，癱瘓跌打等症，用此療治甚效。

樟腦 八錢

番鹼 二兩
四錢

火酒 十六安
土量

丁香油 一錢

先以瓦盤坐沙釜上，隔沙炙盤令熱，隨以番鹼火酒同納盤中，俟番鹼溶盡，然後加入樟腦香油攪和製成後，用瓶貯密。

一方 治風溼症

樟腦酒 清油 濃輕淡水 各等分，和勻，擦患處妙。

一方 療風溼骨痛

樟腦 二兩
四錢 橄欖油 十二安
土量 攪和擦之。

阿魏 魏

出處形色功用及行氣血等方已詳列上文化痰第

十篇內矣，茲不再述。

甘松

此樹產於歐洲高約二三尺入藥則用其根而根復有

小蘗

形色

色棕黃

氣味

苦辣自成一種氣味

覈取

根函有油用法取出其油色頗青其油味則香如樟腦

蓋功力即在是油也

功用

平腦治抽筋

服法

以根研末每服三分半至六分若用油每服三滴至五

滴加白糖調服

主治

腦筋痛 婦女月經過多作痛 弱婦遍身不安或血

薄或心驚或頭昏或腹痛等症 嘔吐及腹扭痛 因胃

滯而致心跳均宜服

初患羊癇

此症少易
寢者難治

久服之亦可獲

效

方劑

一方 療治以上各症

甘松根

二錢 搗爛

清水

六兩

同煎分數服以一日服畢為度

甘松輕淡酒方

甘松根

兩安士半 研攪爛

輕淡香水

二十安士量

共入玻璃封密

連浸七日濾淨由是再加入輕淡香水以仍有二十安士

為度

照英國醫書出

每服三十滴至一百二十滴功效同上

土班釐

出美國草類高八寸根長約一寸厚一分下多幼蘗

形色

棕黃

氣味

味略苦香

功用

行氣行血化痰

西藥畧釋

卷二

行氣行血

土班釐

四六

主治

大熱身弱肺內皮發炎

方劑

一方 化痰補益

土班釐水

同安土

輻淡炭羣

六分八釐

和勻

每服半安每

三點鐘一服

加噤嘴

大麻

此藥原產波斯現在印度歐洲各國中國皆有而

印度所種高山者枝面漿汁最多樹身高四五尺至八九尺不等一年即槁入藥采樹稍嫩枝及花或子陰乾用亦有取枝內漿汁為藥者

形色

西國藥肆所售者有兩等一每枝截成二三寸者色棕

綠一連枝葉帶子裹漿汁成一餅形者

氣味 新鮮者味苦辣

功用 行大腦氣 **主治** 抽筋症令婦人子宮發力頗同

葛凡婦人白帶白濁及月經過多服之均效

方劑 一方 製膏法

加噉嘴 十二兩 搗爛 火酒 八十 安 浸七日擗盡藥內之酒傾

去藥滓用隔水法熬至成膠即是膏也

又方 止痛止抽搐等症

加噉嘴膏 八錢 濃火酒 二十 安士 浸之每服十滴至六十滴

又藥酒方 加噉嘴漿 一安士 火酒 二十 安士量 浸七天隔淨隔

時加些火酒以得回二十安士為度 每服五滴至二十

滴

餘論

印度上人采嫩枝及子焙炒煎代酒飲或作烟吸或以漿爲丸吞初則微醉恍似酒又似鴉片烟其功力亦相類故能止痛寧睡止抽搐也西國人有用以代茶者然飲多則未免頭痛心跳胃不消化之患近年西醫究出行腦氣各藥多有功力倍勝者故此藥不甚通行耳

郁加列省酒

製法未詳 每服五分至二錢

郁加列省膏

製法未詳 每服一釐七至三分四釐

形色氣味容俟查出續爲譯刊

郁加列省油

名郁加列托

製法

形色

氣味

辛苦而溫味如樟腦亦如畢澄茄入口灼辣生津固非美味也

功用

此藥溫補能長肌肉與嘔瀉發表者相反故能煖胃助消化且能發胃腸津液見功甚速

服法

每服五滴至三十滴

以樹膠處為完
其油吞之

或以樹膠水開服亦可

考覈

面有樟腦松香炭匿酸等味嘗之略如松節油功力全在於油則用油較捷於用藥也

相反

蛤利類 各等強水 有鹽鐵劑 水銀所製之藥

鉛錐所製之藥 皆不可同時並用 大瀉大表嘔藥亦

不合

相佐 辛溫味苦之藥 先高寧 樟腦 松節油 畢澄茄

哥拜把 各等藥油 凡藥內有油者皆相合

主治 口內及杏仁核發炎日久用葉搗敷 小腸生線蟲用

以射入肛門 胃炎俗名胃痛 胃不消化或胃大小腸內皮發炎

或大小腸有蟲或嘔吐胃不消化兼見極小之蟲多隆克納食 皆

可服之 凡病後身弱心血虧薄婦人月經枯竭或腸風

心跳面色赭變或子宮不安週身受病或抽筋氣喘腦部

受病或虛弱腦欠血等症極其效驗永不復發

細治用法

此藥亦可引病外出用葉和佛茹兒顛茄菸葉燒嗅之

可止氣喘症、又可滅炎去痰、故氣管內皮肺本體並炎

舊症日久嗽膿者、

新症

屢經奏效、其得力在能由氣管內皮

引病外洩、內腎發炎、或溺管內皮發炎、致內皮腐脫、服

此可引炎由小便洩去、切須小心、不可多用、服過久恐致

腎內皮積血、卽松節油、哥拜把畢澄茄等、皆宜慎用也、

治膀胱發舊炎、尤有奇功、服後小便有藥味、可見藥經膀

胱內皮發洩之據、治瘡疾、功力似相反、然雖可見效、而

截瘡不似金雞納霜之妙、惟應時輕重熱症暨瘡疾、或

感受霉毒各症、將愈、則用此較勝、瘡爛臭穢、可用油、或

以葉浸水洗之、良、又有用此藥水、以和化別藥、節射入

皮者。但以蛤利類之藥。如了刀邊麼啡。開此藥水可免變壞之患。

論列

但此藥雖有煖胃之功。亦不宜多服。服多反令胃腸不

安。打噎氣。胃不消化。所泄下。亦有此藥味。至藥內之油

入血內。如何變化。雖未能核確。其促心脈而長身之熱度

以致呼吸改常。足見藥力之一端。故平人服之。必軟弱無

力。懶言思睡。且藥之氣息。由內達外。或隨汗而出。或由

氣管呼出。或由大小便洩出。小便內數日。尚有藥味。臭惡

難聞。論鼻吸與內服。功力不同。惟氣管內皮受鬱。呼吸

緊速。則吸與服無異。

咖啡樹 產於南亞非利駕亞喇啤亞印度等國野生者樹高

二丈至二丈餘園種者則截去頂枝樹僅高五六尺耳

形色 所結之子每個內有核兩枚核長二三分半圓半平

處有罅裂色灰其核未炒時質甚堅實入藥要炒至棕

黑色乃可用炒透質脆搗研亦易

氣味 炒透味略苦嗅之焦香

考覈 此物內函有咖啡精功力尤峻

功用 解酒毒及解吸鴉片煙過度者西國人以之代茶或

和以白糖牛奶晚間飲之但太濃或飲多反致胃不消化

不能寧睡

咖啡烟

製法

咖啡炒透研末，沸水煎之，加入鉛霜，過輕磺酸，再加入輕淡水煎乾，俟其結珠，卽是藥也。

形色

白色似針之幼珠，氣味嗅之無氣息，味略苦。

溶化

此物雖甌亦不變壞，惟水或火酒能化。

服法

每服半釐，至二三釐，和白糖服。

功用

補腦開胃。

主治

凡大熱症退熱初愈時，服此甚有功效。凡頭痛者，每

半點鐘服一釐，甚效。

火酒

製法

卽以葡萄甘蔗等類取汁，或以穀麥發芽亦可。

第該物須具有糖質者方堪作釀若薯米亦可入釀者緣其面有漿質而漿質則可遞變爲糖也釀時作沸乃發出炭氣而然釀成加甌即可提酒蓋酒不須水沸之度乃卽沸而化汽上騰可離糟粕升出

考覈

但該酒恒濁雜質必須用法濾淨連甌三次方成爲濃

火酒也此酒每百分內面水一十六而實得醇酒八十

四乃藥肆中通行之品欲再濃者須於購時酌加顧該

酒與水及伊打無論多寡皆能相合而且與水相和其色

弗變若酒之內面水者多則重少則輕故以驗酒尺探

之自知酒之濃淡蓋酒本輕於水嘗以二者比較如同是

一瓶在水一百兩而在酒亦只八十二兩耳且水受熱至一百度乃沸而酒則受熱至八十度即沸按此可辨且該酒能化汽升散無水者名爲酒精遇火能焚焚時不作煙煤焚後復無灰滓其與油薪等物有別大抵焚時則化爲水及炭養也

形色

無色過光

氣味

臭香烈而味辛辣濃者不堪入口

功用

行血提神其能令人醉者實在酒精之力也濃者惟

利於泡藥蓋能熔提藥內功用之質也尋常方劑所用

淡火酒亦有定率蓋以火酒清水各半而相和者也若欲

從中加減亦須註明方內

化物

若以火酒化各物亦不一致 其在硫磺燐質則祇化些少而在碘質及輕淡水則可化殊多且鋤養及鎔養亦皆可化惟鋤炭養與鎔炭養則不能化耳 其在植物之類如炭匿酸樟腦樹蕊樹脂與夫各種可飛之油及番鹹等物則俱能化 其在油類亦均能溶化少許而惟蓖麻油則化略多 其在酸類則有可相和者且有與酸類相合而成爲伊打者 其在鹽類則除礬沙之外凡能發潮者皆可溶化若發燥之鹽及水所難化者而火酒亦不能化輕淡綠鹽及水所能化之各綠氣鹽則酒多可化淡養酸合底類所成之鹽亦間可溶若磺養合金類所作之鹽

則又非火酒所能化也

慎用

若濃酒而驟服過多則毒甚將見或發昏或傾倒而面

色忽轉青白淡酒服後亦能令脈數力雄精神提振迨

酒力過後則神倦身疲各腑汁液略少而頓覺口渴舌燥

故有酒癖者往往胃弱難化
食物草用體弱而腦不壞

所以凡用火酒者宜知其詳也

雜用

他如生物遺體而以火酒浸之又能經久不壞

菩提酒

此酒製自呂宋及法美等國有數種或酸或甜或濃

或淡不一而要之均有火酒功力在內

形色

或黃或棕

氣味

其臭香辣其味酸甜

考數

比如該酒一百分其內面有火酒七分八分者此則酒之

淡者也其內函有火酒二十四五分者此則酒之濃者也

然要以內函十五六分者為通行之品

功用

行血提神

服法

每服一酒杯或兩酒杯

主治

身弱胃不消化宜服

病後熱退可服些須蓋與服補

藥同科也

宜忌

身有大熱舌焦喉渴腦痛譫語者均忌用

啤酒

製法

麥子 米 槐花 或加土的年 或加瓜沙以製成者

也此酒內每百份有火酒六份或有火酒四份二份不等

形色

氣味

功用 凡熱症退後身弱者或割症後或大膿瘡日久流膿過多者皆可用作調補之劑

宜忌 凡大熱症身熱時或發炎甚少用此必俟熱退炎消病

勢漸愈乃可用

伊打酒

製法

此蓋以火酒及濃磺強水同甑而用法製成

者也但須加鈹養水再甑令除去磺養酸且以清水和勻而復甑之務使火酒去清庶得純淨此乃淡伊打酒也欲製濃者卽以此酒貯罇加入鈹綠石灰撒勻少頃俟伊打酒上浮隨即倒去其餘則用火再甑以甑膳一半爲度此卽濃伊打酒也

留過

火最易變化故臨時所用一切器具必須適合式庶無變壞之弊

形色 此酒無色其清如水 **氣味** 臭香味辣

比火酒

覈驗

輕於水四分之一大抵受熱至一百零五度而此酒卽沸若樹入掌內旋卽飛去而並令掌冷且當此酒氣與天氣相和之時而或近火則將突然而焚儼如火藥轟烈所以凡近火處不可妄斟此酒

功用

行血行腦氣服後先覺腹煖次則臟腑亦煖

服法

每服宜用一地廉量加白糖調服

主治

婦人身弱頭昏宜服腹有風痛服之可治或嘔吐

或打息逆

俗名打

服此亦能止用療氣喘間獲奇效

外治

牙爛作痛用此酒化樟腦隨以綿蘸塞入患處分

艱苦嗅此亦可止痛。產婦或遇筋抽，尤宜嗅之。月經作痛，嗅此可治。顛症夜不安寢，嗅之可安。腦筋痛，宜嗅此酒，及用哥羅方搽患處。腹內作痛，如係因生膽淋而致，或因內腎有砂，墜落膀胱而致，嗅此酒均可止。

宜忌

惟老人及小孩不宜嗅。大人虛弱者，亦不宜嗅。肺有壞及腦有症，均忌嗅。

輕淡炭養

此即炭強阿摩尼亞也。

形色

新製者色白，略過光，而不甚堅硬。露置則牽吸天空之炭氣而成白散，即化作輕淡炭養也。

氣味

臭辛烈，味辣而鹹。

溶化 冷水用四倍可化一沸水能敗其力淡火酒亦可熔若

置在玻片炙之則質體化氣飛盡

相反 凡酸類底類及鎂養石灰水炭氣蛤利等項均能敗是

鹽也

功用 行血發表化痰解酸及治轉筋並可作吐劑 若論其

行血之功乃令心經發力而非補腦也

服法 每服八釐每二分半若服至五分則吐

服驗 此藥連服日久能令頭頂四肢及外皮作癢

主治 凡病後氣虛血弱者宜服 胃有酸腹脹作痛者此症在胃

多宜服 小便頻數尿味變甜者此症在糖宜服 肺熱將退

者宜服 飲酒過度者服之能補胃 患羊癇症者服此

亦妙 久咳者每服三釐至一分 麻症初起者每服八

釐每兩點鐘一服 紅疹似麻及患癰症者服之均驗

方劑

一方 治喉症心經有病服之良 外嗅其氣亦能

提神

輕淡炭養

一分四釐

銀錦葡吐散

半釐

八角水

一兩二錢

和勻作一服 彼頭困或驟跌發昏者尤宜嗅之

作香鹽法

輕淡炭養鹽

一瓶半粗末

丁香油

一地廉量

臘芬大油

一地廉量

巴機密油

兩地廉量如無此油用香油亦可

輕淡水

十安士量

先以各香油和輕淡水攪勻然後滴入輕淡炭養鹽中至不能食爲止便可製成也功用同上

輕淡香水方

輕淡炭養鹽

八錢研末

輕淡水

三安士量

檸檬油

兩地廉半量

荳

蔻油

四十滴

臘芬大油

十五滴

火酒

二十四安士量

汔水

備足

先以輕淡水加入清水四安士然後以輕淡炭養末投之

另將各香油合而爲一隨以火酒由漸加入

聖該酒爲正

頻頻攪

動由是以輕淡水與香酒相和再加入清水以合共有三

十二安士爲率功同輕淡炭養凡氣虛血弱者宜之每

服三十滴至六十滴

方論

凡應用輕淡者，無論外嗅內服，均以此水爲最通行之品。蓋外嗅則香而宜鼻，內服亦不甚辛烈而易飲也。

松節油

製法、形色、功用詳上利小便篇。此專論其行血而

已

功用

行血服之能令脈行加快。

主治

凡虛熱症、身弱舌乾、胃不消化、腹脹有風、身有微熱而非烈者，服此均驗。更有一種虛熱症，數日後而竟致昏蒙譫語，及微抽搐，甚或大小二便自遺者，服此可行血通腦氣而甦，且能和血脈而安各經也。婦人虛弱腦筋不安服此亦佳。

服法

每服三十滴至六十滴，加蓖麻油一酒杯和服。

如無淨蓖麻油或和微鹽酒同

服可每六點鐘一服

能治通用

凡痲症由腸壞而致者如症尚未深服此則猶可治若

待垂危而試恐難見效也肺熱痰塞服之或效鼻衄

每服十滴每三點鐘一服服至血止爲度嘔血或小

便流血或大腸便血每服三十滴至六十滴和雞蛋白服

每三點鐘服一次若用以療實熱炎症先宜放血或瀉

或表然後服此方妥每服六十滴和白糖水或和蓖麻油

及欖油同服每日三服但須實炎將退而後服之無礙若

熱勢未退而誤服太速則必致脈愈數而病益劇同日須

兼服迴路米或銀錦蒲吐散

外治

倘服此若不能下膈，可由糞門外導，或以外擦腹皮，亦

可驗。

外部炎腫，先以絨布浸沸水，隨即扭乾，次以此

油灑在該布敷之，經數刻後，或覺難忍，撤去可也。喉與

肺或發炎症，亦宜以絨布仿照前法，而敷貼患部，或用以

外擦亦妙。

火氣

論自然而然之火，凡人身體無病，則火氣充足，而氣血

自然流行，即各腑功用亦覺舒暢，此不特人類為然，即推之畜

類亦然也。

論物化

凡物一經變化，即能發熱，譬諸用強酸化金類，即可

悟其由變化而生火氣也。且人當食物消化之後，輒能

發出火氣而令身體溫煖血脈運行是火氣之功誠不可少矣

論天氣

試思天氣和暖則能助內臟發液而外皮發汗汗既發而熱自出若天氣寒冷及虛弱有病而人又必須火烘然後身始煖而血始行是可想火氣之妙用矣然則醫者以火氣入行血調詎無深意於其間哉

外用

第用火氣療症其法有三一用火氣而烘一用熱

水而薰

一則熱水之汽而令體發煖此三法皆西醫所

重也

夫引火氣之法須預備一小房

在着病者內

房外即發

火爐

此時藥力能令天之氣流通

隨以引氣管搭至房裏

房內預

使之相通將

見煖氣則騰騰而入也大概按寒暑表受熱至一百二十度而人之在房中者則面漸熱脈漸數而身亦旋發汗抑受熱至一百三十一度則通體將必發紅而略覺微腫此時則發汗愈多黃平居外受熱九十六度身覺得和平暑過多而自覺發汗凡用火氣療症殆莫善於此法也

熱水薰法

其法先將衣服卸去即坐諸透氣椅上而頸臂之下則以衾圍覆隨用熱水一盤放在椅下薰之水若少冷續加煨紅石卵投諸水中使水之熱汽騰蒸自可令病體發煖也

熱水汽法

令病者卧於榻上而擁被蓋之其被宜略為築高由是在榻旁

置一鍋煎水至沸，隨以引氣管，由鍋裏搭至被裏，將見熱

水之汽，紛紛透入，而病者之弱體，亦可令其發煖。此法或用以薰體，或用以薰

生或周學臨二千一足以上三法，皆能令血氣流行，醫者宜悉察也。均惟在彼之靈藥耳

雜治

凡久患風溼症，即宜烘以火氣，或用布焙煖鋪之，或炒

熱生鹽，裹而熨之，亦妙。救溺死，則先去溼衣，易以煖衣，

隨用火氣烘之，務使身體復煖，庶易療治。小兒麻疹，或

未出齊，或出而復收，宜用熱水薰之，以助其出。皮膚生

鱗，而致污垢者，宜先薰以熱水，後用藥塗。且飲熱水，熱

茶，或用甘菊薄荷煎水而飲，均能令血快行，並令小便及

汗多發。若欲喉水，一用煖水浴身，大約受熱至九十多，或一

百度便合。凡浴以煖水，不特去其污垢，及令患處塗藥。

易入。彼皮膚症，或生鱗，或結靨，卽以煖水浸之，能令患

處血行，而鱗靨盡去。月經停滯，及患白帶，用水節納煖

水射入前陰。大便乾澀，及患紅痢，亦用煖水射入糞門。

一用熱水浸身。

凡浸身時，須用一桶，並可療多症。

大約受熱至一百度，或一

百一十度便合。凡工作疲倦，宜浸以熱水。腹痛吐瀉，

亦宜浸以熱水。久患風溼，及顛狂等症，用熱水浸之，良

小兒筋抽，卽以熱水浸之，尤妙。大小便痛，及溺不能

出，月經不調等症，用熱水浸下身。傷風及頭痛、喉痛，宜

用熱水浸足。浸時，則以衾圍身，並飲熱茶，自可發表。

論止痛寧睡之劑

凡人痛不止、寢不安、則每易損身。此止痛寧睡之劑所由重也。大抵該劑屬腦。服少許則能令血行、服略多則能令腦安、身安、睡可寧、而痛可止。若服過多、則反令沉睡、而莫能喚醒也。蓋該藥多屬毒品、醫者用之、慎毋過多。凡止痛寧睡、當以鴉片及綠養冰爲最。惟鴉片服後、則能令各臟津液減少、大便乾結、而瞳人亦縮小也。聞羊花佛茄兒及顛茄等藥、亦能止痛寧睡、而究之功力遠遜。且服後、能令眸子散大、惟不至大便乾結耳。已上各藥功用、正宜分晰。若夫病者之痛不一、有宜於服是劑者、亦有不宜於服是劑者。醫者於此、又須細辨、正毋謂凡是劑者、亦有不宜於服是劑者。醫者於此、又須細辨、正毋謂凡

遇有痛概宜服也 蓋忌服此藥者亦不一端 一孩穉不可

妄服 一孕婦慎勿過服 一凡腦有炎者概勿服 他如懼

服此等藥者又須略爲多服方能獲效 譬諸有煙癮者若祇服

鴉片輕劑殊無效驗也 此種藥宜服在晚間若身弱而症重

者服此應由少漸加不宜急躁 且用是藥者其法有三 一

由口服 一以藥化水用水節射入肛門 一用小水節刺入

皮內而以藥水射之均妙

鴉片

此物以產土耳其者爲上次則印度再次則中國

割取

該樹莖高二尺子在囊中囊形墮圓而扁徑二三寸囊

之殼面有汁將熟時則以刀自下至上而淺割小口夜間
即有汁流出凝粘殼外次早收取其汁而再割之以間日
一割爲度可割六七次由是將各汁積聚器中而結成大
塊此卽鴉片土也

形色

囊嫩色綠者汁多乾老則少汁在殼不在子而子無功

辨別

考其樹原產波斯今西國通用者則以土耳其與埃及

之所產爲重也若入中國者多產自印度但印度所產原

有二種，一作球形而大如柚者，此則俗呼爲公也，一作餅塊而無皮者，此則俗呼爲白也。彼產自雲南者亦呼爲白。然功力之峻烈則究以公爲最。至若將業經取液之囊熬水成膏而用以攪入，此則屬最下之品也。

上內形色

棕黑稠如膠，露置漸成堅硬，若作散其色棕黃。

氣味 味苦辛，臭腥悶。

溶化

此散入火可焚，清水淡強水及火酒均能提其功力。而伊打則否，火酒能鎔五分之四，清水或溶四分之三，而水所化者亦呈棕色。

考覈

其實內原尚有鴉片精十餘種，如摩啡、高底亞、拏葛定。

美幹泐酸等類，乃最顯著者也。但功用究以麼啡爲最大，評論高下，卽以函有麼啡多寡而定其品。蓋麼啡多，則力峻而價昂也。且鴉片每百分則以函有麼啡六七分者，方堪入藥。若過少，便不足用。曾覈土耳其所產之鴉片，每百分函有麼啡十分者，上等；間有函至十五分者，至拏葛定，則鴉片內函多少不等。少則每百分函一分半，多者函十分。

覈取

法用熱火酒

須以藥名爲準
五十二分爲度

六十分，隨以鴉片十五分投入。

浸泡濾淨，取汁，復以熱火酒四十分浸其餘滓，隨用麻

布絞攢取汁，而與前汁和勻，再行濾淨，加入輕淡水四分。

貯十二點鐘久俟結珠置麻布上而以水淋漂數次卽貯於水盤中如此則所製得之物內有二種 一屬孳葛定此則體輕而上浮於面也 一屬麼啡此則體重而下墜於底也若取墜底者提去水滌焙乾最爲上品彼上等鴉片每十五分可得麼啡一分或一分半然必須產自土耳其者其麼啡方有如是之多若產印度中華等處則不及也

物驗

此等物聯質太雜查驗不易惟麼啡及美幹泐酸二種究爲他物所無如覈物內之面有此二種者卽知其潤有鴉片誠以鴉片中方有此兩物也 覈美幹泐酸卽將所

試之物用水開化加入鐵絲酒其或變紅色則約略內酉
美幹泐酸然不論色變與否而將水濾淨多加醋強鉛水
倘有鴉片則美幹泐酸與鉛相合而作鹽墜底其所餘之
水則函有醋強麼啡及醋強鉛由是將其水入以輕磺酸
氣使作成磺鉛隨即濾出然後將水煎去輕磺氣分作三
筭如此則自有法可覈出麼啡也其一加以硝強水合
麼啡變作紅色其二加以碘養酸則麼啡敗卻碘養而
水變棕紅抑或有漿濁雜則水成藍色其三逐漸加入
輕淡水倘或成鹽而鹽即麼啡且復多加以輕淡水或銕
養水倘復鎔去即可定爲麼啡也蓋麼啡珠合硝強水則

成紅色，合鐵綠水，則成藍色。此即麼啡之確據也。一法

加入炭匿酸，則麼啡與酸相合，而自結珠。此法詳見初階卷四，藥學部，酸在第一百十一節，嚴密。

第一百
李磊

功用 能止痛，補腦，平腦。平人略服，則益腦提神，而令脈快

有力，遍體筋肉皆覺收濇，惟腦則受功力最多，故至略醉

然未幾而醉氣胥捐，自覺心神舒暢，而忘卻平夙經歷之

苦。於是越三四刻即睡，越四時始醒，醒後頭昏喉悶，倘

不繼服，則越二三日而復如平人。凡鴉片服後，則內腑汁

液略少，而皮外汁液反多，能止痛而緩筋，彼四肢不安者

服之可忘，且服鴉片若未及致睡之分兩，則精神提振而

腦筋肉筋發力略久自覺不能酣睡也若過服則未久即
睡。歷半日或經日而始醒醒後則身驟弱而腦幾不能主
體其脈慢而無力其目倦而欲睡睡後難醒醒後忽仍再
睡鼻息作聲倘當其痰凝氣管而突然呼醒則又將神昏
而譫語也若夫誤服過多係自取滅亡者始則頭昏繼則
不醒人事脈沉目閉眸子收縮將見遺身不能運動而呼
吸欲絕久之則痰塞氣管而呼吸極其艱辛面白唇青呼
之不醒如此則或五
六點鐘或十一
二點鐘而氣絕矣但
已上所言皆作藥服而非吸食也

論止痛

此物首能止痛蓋症有多等痛不可當者服此可止

臟腑發炎作痛，先用涼劑去炎，隨用鴉片止痛，甚驗。惟身
尚有太熱者，俟熱退方可服也。心痛、腹痛，係由胃不消化
者，先服吐瀉等藥，後服鴉片而痛可止。若膽淋及內腎淋
等症作痛，先以熱水浸身，次服鴉片止之。小便痛及婦人
經痛，亦先以熱水浸下身，而後服此，庶易全愈。牙痛、耳痛
服之良。或用綿蘸鴉片酒塞入患處，初患風淫時，或作痛
服之可治。或用鴉片酒射入糞門，有等毒瘡雖不可療，而
當其痛劇，服此亦可緩痛。

論寧睡

有等症不能安寢，及憂勞過甚，夜不成寐者，服此能
治。甚至或發瘋顛，或發酒顛，而竟夕喧嘩者，服之亦可就

寢

論平腦

且鴉片能治抽筋，蓋該症有由羊癇而發者，有因室後而起者，要之抽筋一症，實由腦力妄發，服此即可平腦。至於能止瀉嘔及可發表、止咳、止紅白痢，亦是見鴉片之妙用也。

論調佐

他如服別藥而仍貴以鴉片加入者，其妙有二：一能禁止別藥之烈，一能助起別藥之功。如服各等瀉劑而貴加些鴉片者，是以鴉片制其猛烈也。如用迦路米汞藍丸等作改病劑，而必合鴉片同服者，是以鴉片助其功力也。如用衣畢格作表藥，而必偕以鴉片者，是以鴉

片助其發表也。如用樟腦療痛而貴加以鴉片者，是以鴉片助其止痛也。

宜忌 顧鴉片一物，惟身熱、腦炎、大便艱澀及內腑將作炎症者，均宜忌服。

外治通用

用鴉片之法，除內服外，或取以化水，用水節射入肛門，或用小水節刺入皮內，隨以藥水射之，均獲功效。止痛

寧睡及治各症，每服一釐或二釐。若有煙癮者，宜重服。

然或多服而仍不應，則以藥水由肛門射入立驗。嘔吐

不止及大腸痛、內腎痛、膀胱痛等症，亦宜以藥水射入糞

門。

相反

石灰水 炭匿酸 鈹炭養 鎢炭養 鉛銅錐鐵汞

等質所製之藥 顛茄 了刀邊 咖啡

相佐

酒 綠養冰 佐平 草烏頭 藜蘆 路卑利

方劑

一方 止肚痛

鈹養 或鈹淡養 三錢 麼啡 一厘七或三厘四 香散 一錢

和勻分十二包空肚服一包和粥水或牛奶服

附香散方

丁香玉桂等類合成者

方論

凡紅白痢宜先服大黃等類以去其積滯後服鴉片丸

或鴉片酒或麼啡均效 論止咳凡乾咳無痰者方合如

痰多用此恐至痰塞氣管宜佐以化痰藥為妥如鴉片表

散是也

覺世子評曰、試思鴉片一物、俗名罌粟、又名米囊、時珍采入本草、其花名阿芙蓉、汁液名阿片、治久痢脫肛、爲丸可止、臍下腹痛、今觀西藥亦用是物療症、止痛、但西醫不僅徒知其益、更能預防其害、既考別其物理之當然、愈窮極其物性、與人身之所以然、詳讀上文、服後入腦情形、足見體驗功深、非格致精微之學、具憫世濟人之衷、曷克臻此、故能用此治病、畱心博節、不令病者久服、以致一患除、一患復生之弊、慨夫衣冠下土、搢紳濁流、短榻橫陳、忘形脫略、或以燈燒而吸、或以爐炭而吹、甚者及其二三沙三沙、終年如是、晝夜相沿、癮重

者四肢柴瘠、骨痿筋疲、無志營生、家財消耗、既顛倒平晨昏、
又暗竭其髓海、蓋腦部既涸、五官百骸、無非受病、如朝廷昏
蔽於上、賢才屈抑於下、而欲久安長治得乎、緬昔通商互市、
海水羣飛、烽起一燈、毒流宇內、致令多方設法、明禁之而不
能、重稅之而愈盛、真乃飢狂泉而逐臭、升厝火於積薪、不啻
長沙痛哭年也、而尙忍心蔑理、甘之如飴者、不第仇忘君父、
居然嘯傲烟霞、是真全無心肝、空負栽培高厚、有志斯世斯
民者、當如何裨躬飭已、使之返樸還淳、勤儉風行、雖賞之羞
慚不吸、古聖王帥天下以正、不令而從、蓋徒託空言、總不若
徵諸實政之捷如影響也、更有無知婢妾、吞膏殞命者、不勝

枚舉願諸君未食者切勿逢場作戲誤墮迷途既誤者及早
猛醒回頭齊登覺岸實自愛愛人之道也大造生成一物自
有一物之用亦庶乎無憾焉矣

鴉片表散

製法功用已詳土文發表第十篇內茲不再

述

製鴉片丸方

鴉片土

一錢
研末

番鹼

二分

以水調勻作丸六十顆

按此則每

丸內約有鴉片一釐七也

主治功用與鴉片同每服一丸

鴉片酒方

乾鴉片土

二兩

火酒

十六安
土量

清水

十六安
土量

先將水浸鴉片三日夜每日攪數次然後加入火酒再浸三日濾攪餘滓則復用淡火酒漂淋至前後共濾得三十安士為度每服十五滴至三十滴或四十滴

樟腦鴉片酒

製法

乾鴉片士

錢

辨佐匿酸

一錢

樟腦

七分

八角油

一廉量

蜜糖

二安士量

淡火酒

三十安士量

以上各味和勻浸

七日濾淨每服一錢至二錢小孩咳瀉腹痛每服五滴至一十滴蓋此酒不甚峻烈乃西國最通行之品也

鴉片菩提酒

製法

乾鴉片士

一兩六錢

桂皮末

一錢

丁香末

一錢

菩提酒

西藥畧釋

卷三

止痛寧神

樟腦鴉片酒

鴉片菩提酒

一

十六安
土量

和勻浸七日浸畢入路器濾隔由是再加些酒

至濾淨共有十六安土為度每服六七滴但此酒之味比

上方略濃兩倍多作外用而甚少內服

功用

久患眼熱及有膜者加水冲淡滴入眼內

無臭鴉片酒

製法

乾鴉片土

兩安土
研末

伊打酒

八安
土量

火酒

八安
土

清水

足
用

先將清水八安土浸鴉片末足十二個時辰攪盡其水再

換清水八安土浸如前攪盡其水二次之水和併一處煎

至臘四安土為度俟冷加入伊打酒八安土和勻貯好俟

伊打酒升騰淨上將上面之伊打酒傾出然後再煎至伊

打酒之氣息全無加入清水二十安士用紙濾隔後再加些清水取足二十四安士爲度乃入火酒八安士以樽貯密卽無臭鴉片酒也

氣味

較鴉片酒略淡

功用

與鴉片酒相同

相反

與鴉片同

磨啡

製法

鴉片土

十二兩切薄片

鉅綠

六錢

獸炭

二錢

輕淡水

足用

汽水

足用

先以汽水四十二安士浸鴉片土十二個時

辰將水傾出貯好換加汽水四十安士浸如前將水傾出

西藥畧釋

卷三

止痛寧睡門

磨啡

完

和初次之水同貯，復加汽水如前法，將其渣內之汁搾盡，用隔水法，將前後三次搾出之水，炖至賸二十安士乃止，用布濾隔，又以汽水四安士和鉅綠一併放入隔淨之鴉片水內，再煎至冷定可成實體爲度，俟冷時以布包兩層，用重力壓之，壓出之水，用器貯好，布包內之膏渣，以沸水十安士和勻，隔以紙，隔時加些沸水，隔出後，再煎至稠結，仍照前布包壓盡其水，又將其渣如前法，隔煎包壓至乾，三次搾出之水同貯一器，其渣卽以滾汽水和勻，加入獸炭_{二錢}，浸二十咪呢之久，隔淨後，以漏斗加些沸水過之，加入輕淡水略多，冷定結珠，卽麼啡也，以冷汽水洗之，焙

乾入樽 上三次壓出之水色黑加些汽水及飯養水以隔之加輕綠酸略多和勻以獸骨灰投入再隔淨加入輕淡水俟冷定能結些沙麼啡

形色

珠形三角不甚長色白過光氣味無臭而味苦

溶化

冷水一千分能化一沸水五百分能化一 冷火酒五

一分能化一 沸火酒三千分能化一 哥囉方二十分

能化一 甘油二百二十分能化一 伊打酒不能化

麼啡鹽

夫麼啡水既不能化故入藥須用其合強酸所成之

麼啡鹽水乃易化也

功用

蓋麼啡卽鴉片之精而功力尤峻醫家用此實取其服

少而見效大也

服法

麼啡鹽每用一釐

清水

一安士量

開化或分三次服或

分兩次服如應服多者須一次服清

相反

與鴉片同

麼啡礦養

製法

麼啡

八錢粗末

汽水

八安士

淡礦強水

足用

先以麼啡末和入汽水再加礦強水漸漸滴至麼啡化盡

但加時不住手攪勻以無酸及無蛤利味為化盡再以沙

鍋隔水炖之炖去水俟冷結珠以紙漚去水溼微火焙乾

人樽貯密

此物用玻璃瓶裝入樽內加封八錢後須足用八時不致變壞後用時須將瓶內之珠仍須攪勻乃可

形色

似針之珠色白能過光

氣味

味苦

溶化 水二能化一 火酒多於水乃能化一 甘油五能化

一 伊打酒不能化

服法 每一釐七分五次服至兩次服

評定 論各種麼啡鹽以此最爲通行

方劑 一方 戒洋煙

麼啡磺養 三釐 金雞納霜 五釐 丁香末 二分 桂皮

末 二分 清水 五兩 和勻 彼有煙癮者其始早晚每服

五錢越兩日早晚每服三錢或二錢以漸減少至服畢則

癮可斷 若作丸則除去清水加糯米粉及甘草末和勻

爲丸三十粒始則朝夕每服三四粒由漸而減俟至服完

先三 麼啡輕綠

煙癮自脫，但麼啡須用之有度，不可過多，誠能依此戒之，自可斷癮，若多用則反難戒也。

麼啡輕綠 製法

麼啡末 八錢 汽水 四安 輕綠酸 足用 製同麼啡磺養

形色 珠白細如絲，或三角長珠，氣味 苦。

溶化 冷水二十分能化一，沸水一能化二零，凍火酒六

十分能化一，沸火酒十分能化一，甘油十九分能化

一，伊打酒不能化。

功用 服法 同麼啡磺養

麼啡醋鹽 製法

麼啡 八錢

汽水 八安

醋 強酸 足用

製法與麼啡磺養同，但煎去水時，須煎至如糖水之稠，俟其冷

結珠，形色新者色白，貯久色變黃灰，終則轉為棕色，不堪

用，要再製，方合用。氣味味苦，微帶水醋之氣息，貯久

漸漸失卻醋強酸，故臨用時，酌加些醋強酸，令其易化。

溶化 水易化，火酒化之略難。哥羅方六十分能化一

伊打酒不能化。

主治 外用節射止痛，凡腦筋痛劇，諸藥固效者，宜用此。

麼啡醋鹽 八釐 清水 一安 調勻

凡用以節射入皮裏者，始則約用十滴，以漸而至十五滴。

每日射一次或兩次如此立能止痛較勝於內服也且此法有宜貼近患處而射者有不必貼近患處而射者均能見效

總論

以上所用麼啡三種皆屬通行之品另有麼啡數種

一麼啡雙味哥瀝鹽 一麼啡輕溴鹽 一麼啡炭匿鹽

和甘油 一麼啡輕碘鹽 一麼啡甘松鹽 此數種不

甚通行姑存其名耳要之內服用麼啡既比鴉片省少

而以麼啡水射入皮裏又省少於服也

高底亞礦養

製法

其在以鴉片製取麼啡之時倘有高底

亞在內須設法取出

形色

氣味 味苦有蛤利力

溶化

沸水十七分能化一 冷水八十分能化一 火酒伊

打酒能化 功力與麼啡同而略遜 用四釐可及麼啡

一釐

功用

止痛寧睡而寧睡尤勝於麼啡寤寐安恬絕無煩躁之

患

相反

與鴉片同

哥囉碘

製法

哥囉方

四安

麼啡輕綠

二錢

輕炭淡酸

些二錢淡

薄

荷油

十滴

磺強伊打酒

一安

糖水

四安

甘草膏

兩安

半

火酒

四安

先以火酒化麼啡及薄荷油後加哥囉

方伊打酒另將糖水溶化甘草膏二併和勻後將輕炭淡酸加入

形色

色黑

氣味

香甜

服法

每服十滴至三十滴

每一錢內有
庶啡一釐七

功用

止痛寧睡止嘔止瀉但用此極宜小心謹慎切勿過服

多服也

加味伊打酒方

伊打酒

八安
士

火酒

十六
安

伊打油

六地
廉

三味

和勻

形色

無色見火易焚和水則略渾濁因在內有油故也

氣味

氣香味頗甜辣

服法 每服三十滴至六十滴和水飲之

功用 行血氣止痛但有身熱時勿遽服 凡腦部不安睡不

寧及腹有風者服之均效

附伊打油製法 用火酒、磺、強水、清水、伊打酒和勻用法製

成者

綠養冰

西名暗
嚙利

製法

先以醇火酒貯玻璃樽次用法令綠氣入火酒裏如此則兩物相
合俟略久則成爲綠養冰

考覈

覈以化學詳此物質乃炭輕綠加輕養也若無輕養在
內似油之流質重過水一零五有輕養在內即聯珠爲綠

養冰若和火酒釵養燂熱則轉凝釵蟻鹽

形色

聯珠爲塊，人清水能發出似油之點。

氣味

其臭辛烈，其味另成一種，乃邇來新製成者也。

溶化

和水燂熱能化，若以珠炙熱則熔而化，氣升散，故可甌。

功用

寧睡安腦，彼患病腦不安睡不寧，而服此可治。

叅訂

他如麼啡一藥雖亦寧睡，惟服後則各臟津液未免減。

少卽大便亦未免乾結，若服綠養冰則無此弊。

主治

凡腦筋骨鉸有痛，及割症傷口發痛，服此可止。暇喘。

服之而氣亦順，筋抽及狂症服之能安腦，婦人臨盆。

服之能止痛。

服法 此藥每服一分半至五分，加白糖調水服，惟初服者

不宜多用，以漸加之可也。

枯奴頓冰 化學覈出，此物質炭輕綠養，加輕養也。

形色 若輕養在內，形似油無色，重於水，加輕養則結珠成片。

靚如銀繭。

氣味 臭與綠養冰相似。

溶化 火酒、甘油或熱水皆易化，冷水難化。

功用 止痛寧睡、安腦，與綠養冰同。面部之腦筋痛尤效。

服法 每服三釐，至二分半，用多水調服。

主治 婦人作悶頭痛，服之痛止。每服八釐半，每三點鐘一服。

銀溴

製法略同銀碘，形狀亦相似。

形色

白而不過光，其結珠則作立方形。

氣味

辛而鹹，溶化冷水能化，而沸水所化尤多，惟火酒

祇化些少。

覈驗

法以銀溴入玻璃樽，用水化之，加入綠氣水少許，由是再將伊打酒加入，攪勻，將見伊打能化，溴成紅色，而自升浮也。

功用

此亦入改病藥，略同銀碘，服之能令各腑多發津液，及能平腦，若過服，則頭昏痛，奄奄欲睡，而足脛亦將失力。

服法

每服五釐至二分半，用水沖化，每日三服。

主治 夢寐不寧及狂症夜不安寢者服此能治 且服是藥

能禁慾火及治遺精每服宜用三分半日服三次服藥後

並宜屏除慾念調養身體方驗 肝脾發大每服五釐至

分半 癰症腦體未壞者服此可治 白濁及婦人月經

過多宜服 小兒或疳積或筋抽均宜服 疔後皮膚發

症亦宜服 初起羊癰輕症服此最效

方論 至若療癰癰疔等症其藥力不及鈹碘故醫者多捨

是而用鈹碘也 凡用此藥療症必須久服方獲功效若

偶服之殊無徵驗

作藥膏方 鈹碘 五分至二錢 淨豬油 八錢 攪勻外塗功用同上

西藥各牌 止癰寧門 鈹碘 共

十月
終
二
ノ
ヲ

卷二

三

改病藥論

凡人體內體外，或久患病症，或久患疔毒，而服藥能漸除者，卽謂之改病劑也。顧改病各藥類多，酷暑倘或多服，輒能壞人。且此藥與吐瀉等劑不同，蓋吐瀉等劑乍服卽驗，而此藥則久服乃效。所以凡用此藥者，宜少服，亦宜久服，然後有濟也。大抵該藥服後，或在腦，或在血，或在臟腑等處，而徐發其功。如鎮質功力，則多在腦處而發；如汞藥功力，則多在臟腑肌肉等處而發；如服碘質，其功用固發於臟腑肌肉，而尤發於體內肉核。如服僵質，多則能令血薄肉削，而少則乃獲其效。然則改病之劑不一，豈得渾視而弗辨？醫者須驗其究屬何症，究宜何藥，而

後能奏效也。服藥後切宜戒口，須擇其合宜者食之，推之寢室亦宜通爽，毋使陰翳，四肢亦宜運動，毋過安逸，而庶易告痊。但華人服藥，多求速效，倘經服一二次而猶未應，旋即棄去，故往往輕忽是藥耳。惟西醫深知此藥之性，務令病者久服不厭，所以能收其效也。

山水內有蛤蚧力

西國近年覈出山水內有面蛤蚧力者即

取此水以治病功力甚捷云附錄於此方用未詳

山水內有鹽類

同上

輕淡

查化學初階卷二第十一篇十九章內此物本雜質

也惟合養氣成蛤利與鈹鎔合養氣成蛤利同

論列

此氣功用治病雖未詳述但輕淡綠由此質加鈹鎔水

銀而成輕淡水又用輕淡綠製就可知化學格物之功於

西藥大有關涉欲精習西藥者不可不於化學立其基也

輕淡炭養

製法形色功用治病俱詳卷二行氣血門第

篇

內茲選入改病門方劑俱仍舊

輕淡甘松鹽

製法

甘松酸

輕淡綠

石灰

和勻用法將輕淡氣放

出入一樽內該樽先貯甘松酸使之相合即成鹽

形色

成四角珠無色

氣味

臭如甘松酸味甜辣

溶化

水及火酒能化

功用

改病止痛寧睡

主治 腦氣痛頭痛腦不安夜不能睡心跳等症

服法 每服三釐四至一分七釐

輕淡燐養 製法

燐養酸 二十安土 濃輕淡水 足用

以輕淡水漸漸加入燐養酸內加至輕淡水略有蛤利味然後煎乾再和輕淡水少許至仍有蛤利味爲止收存結珠速以紙漚乾入樽

功用 改病

主治 風溼尿有酸者服之甚效

輕淡水 西名亞 製法

西藥學 卷三 改病藥論 輕淡燐養 輕淡水 虎

石灰 四磅 輕淡綠 三磅

共和勻，倒入鐵罐，隨將樽坐

入沙釜，由是復設玻璃四箇，分列次第。大抵第二第三者宜用雙層之樽，第四者仍用一層樽。

即將通氣玻璃管一一插入各樽之口，而並以象皮管鑲連。

其第一第二之玻璃樽不用貯水，第三者則貯水三十

其第一第二之玻璃樽不用貯水，第三者則貯水三十

二安士。昂滿須大於別樽。第四者則貯水十安士，昂佈置停妥，即在沙

釜之下用火燂熱。瓷瓶加以樽中藥氣，不致入第三玻璃樽為度。令藥氣由鐵樽發出，先透

過一二三之玻璃樽，然後透至第四，如此則可成為輕淡水

也。製成後，其玻璃樽之第四者則屬淡水，而玻璃樽之第三

者則屬濃水，蓋內有輕淡水四十三安士也。

又法 用甌煤氣所騰之水，加入礬養水，先行和勻，次以石灰

調水調至略稠，然後一併攪勻入罇，仿照上法製之。大
概用此法者，其價頗廉，而且可用巨罇多製輕淡水也。彼
藥肆所售者多屬如是。

形色

形同清水，比水還輕。

試以二者比較，大約在清公重一千分而在此濃藥水則重八百九十二分，濃藥水則重九百九十分而已。

氣味

臭味殊辣。

濃淡

此藥水其濃者，每百觔內有輕淡氣三十二觔半，其淡
者，即以此濃水一和以清水二，便可製成。

相合

若與酸物相合，則又可成為鹽品。誠以此水原屬蛤利
之類也。

功用

療症功同輕淡炭養，內外用之均能獲效。若以濃水

塗皮則能作水泡 嗅其水亦可提神

但須防喉喉不宜
類影前及後鼻

方劑

一方 外用搽風溼骨痛甚驗

輕淡水

二安

白欖油

三安量或
星油亦可

凡腦筋作痛布蘸藥水敷

上

若潤約五
奈便合

外用銅片壓實片刻

或以綿蘸此水敷之隨

用小杯蓋密令皮發紅為度二法均妙 心口痛及喉痛

宜以布蘸藥水敷其胸脅或外塗亦妙 氣喘以些少搽

喉亦可略止 毒蛇咬傷宜服淡藥水十滴至二十滴每

半點鐘一服並外搽傷口 蜈蚣咬傷及被蜂螫即用此

藥水一生油一鴉片酒一三者同重和勻塗之

凡以此水
摩症均宜

用淡不宜用濃
否則反以貽害

輻淡醋水 製法

醋强酸

十安

輻淡炭養

三安

清水

五十

先以輻淡炭養研末放入醋强酸內加至無酸無蛤利味後乃加入清水卽是藥也

形色

清如水無色

氣味

酸嗅之刺鼻

功用

改病

服法

每服一錢至一安

主治

輕淡香酒

即輕淡香水

製法形色氣味功用服法主治均詳卷行

血及氣門第十篇內茲改病門亦可通用故再列之

礬養酸

製法形色功用服法主治均詳上文補藥門第十

篇內矣茲改病門亦可通用故再列入

硫磺

形色氣味功用服法主治均詳上文瀉藥門篇內矣茲

改病門亦可通用

山水內有硫磺味

西國中國皆有此水 功用略同硫磺

碘質

西名按
阿顯

此物原質也由鹹洋草灰甑製而成

形色

作片珠色頗黑略返光如金類燂熱化氣卽呈紫色露

置則旋化散

氣味 無臭味苦澇

溶化

清水難溶每七千分方能化一若以鋏碘水及伊打火

酒均能溶化

功用

碘質服少許可作補藥及改病藥服後則胃自消化全

身覺有補益能令內腑多發津液及口生涎

慎服

但此藥性甚烈多服則能壞人若服七釐至一分而喉

卽緊悶及腹痛作嘔凡服碘劑若覺有此徵者卽應停服

服法

服此藥者照三方次第輕重切勿增減爲要

首方

碘片

一釐

鈹碘

二釐

清水

八安士量

和化初服每日

宜分三次共服此水六安士，歷十日後，則加至每日共服

八安士

次方

碘片

一釐半

鈹碘

三釐

清水

八安士量

和化既服首劑

歷二十餘日之後，宜將此分開三次，限一日服盡，約以照

服十餘日為度

三方

碘片

二釐

鈹碘

四釐

清水

八安士量

和化亦宜分三

次一日服盡，惟已服首次劑後，方可服此，須服至全愈為率。大抵雖遇極重之症，亦不宜越此分兩也。以上三方所用碘片鈹碘，係由漸而加多，凡患各種雜症，係因疔毒

而致者服此甚效昔有法國名醫膏以此法療人而屢經
應驗者也

外治

三法

或作藥酒外擦 或作藥膏外塗 或以碘片

化氣而薰患處 如用碘酒碘膏外搽皮肉而覺有針刺

及作紅黃色此乃碘質透皮入血而然惟連搽數日其外

層之皮則漸次而脫 碘酒方 碘片 三錢七分 鈹碘 一錢八分

半 火酒 十九安士量 和化此酒可入服劑並可外搽內服

則每次自五滴至二十滴加水沖服外搽則能治癰癤脫

皮癬骨鉸腫 俗名鶴膝 及由疔毒發出各症

碘膏方

碘片

五分四釐

鈹碘

五分四釐

火酒

六十滴

淨猪油

一面六錢

法先以碘片、鉍碘和酒研化，復以豬油加入研和。至若以碘氣療症，與其用氣之熱者，不如用氣之冷者。蓋以碘質炙熱化氣，而由呼吸入肺，則不免作喘。及令肺之內皮發熱，惟吸冷碘氣者，庶無窒礙，並可療久咳及內傷嘔症。

法以碘片

三分四釐

貯入大口瓶內

瓶以能密水三匙為度

令病者在瓶口

吸此藥氣，每日吸二百日，自可獲效。

服驗

凡內服碘劑及外塗碘質，而欲覈其是否入血，則有一法。法以紙蘸漿水晒乾，隨將紙以試日津，或溺亦可。倘紙色由漸變藍，即可驗有碘所存。故服碘劑者，宜連日肉食，忌一切米薯具有漿質之物，蓋漿質喜吸碘而相合也。凡

服此藥宜在飯前一點餘鐘 服碘劑後若覺有腹痛作

悶則應略為減輕或加鴉片少許和服若大便乾結則應

兼服瀉劑然或作瀉略多則應兼服止瀉藥

主治

瘰癧症宜以碘酒內服外搽但須小心不可將皮擦破

倘瘰已略潰宜搽淡碘膏若潰已久宜洗以碘酒並內服

碘劑 凡患各部瘰癧者恒多血質虧壞縱有子嗣其背

骨及手足長骨亦多軟弱而微曲耳流膿水眼發虛熱等

症患此症者其瞳際則暗而有膜也 倘各症有其一均宜以碘合鉍碘和水服

並宜以碘酒外塗眼蓋 療瘰癧眼膜方 碘片一釐

鉍碘二釐 清水半安土量 和化滴入眥內 疳疔初起

宜外搽日久疔毒入骨須外搽及內服 毒瘡係由疔
起者宜外搽淡碘酒並服碘劑 日久潰瘡先以藥膏塗
患處隨以布夾碘末^二 釐蓋上其布面則再蓋錫薄令
碘片不能化散自可治也 婦人氣癭初起內服外搽甚
驗昔有西醫嘗以碘質療是症者凡一百二十名其獲痊
者八十七獲微功者十而不效者僅二十三耳 乳核硬
症宜外搽內服日久可消 病後肝經發大及瘡後脾體
作脹均宜用碘片內服外塗 療粉瘡法 先以刀將瘡
割開令該粉去盡而後以濃碘酒用筆塗入搽畢俟半點
鐘或一點鐘久其瘡袋自可鉗出也 厚皮癬干層癬亦

宜以碘酒搽之 水疔經針之後宜以小水節納碘酒射

入此酒用碘酒
清水三和如此則能令腎囊內皮發炎而一經炎退其內

皮即行合連而不復生水

外搽碘水三方 首方 碘片三釐半 鈹碘七釐 清水十二兩

和化

次方 碘片五釐 鈹碘一分 清水十二兩 和化

三方 碘片七釐 鈹碘一分四釐 清水十二兩 和化 此碘水

分濃淡三種彼患瘰癧各症者酌用之可也

又方 骨鉸發大骨痛及疔毒等症搽之自可獲效

碘片四錢 鈹碘八錢 清水六安士量 和化此方亦可外塗或能內服
惟藥味極烈不可多用

吊水泡碘酒方 碘片九錢 鈹碘三錢 火酒五安 和化

此酒不入服劑以筆蘸塗皮上每日二次能作水泡

吊水泡碘膏方 碘片八錢 甘油一安 先以碘片四錢投甘油

中俟化復將餘碘錢投之俟化盡用以外塗可吊水泡

又方 鈹碘一分 甘油二分 調勻再加碘片一分攪和以

筆搽在皮上加紙蓋之勿令碘質化氣約歷一二點鐘亦

可作水泡

外浴方 碘片一錢 鈹碘二錢 清水一百二 和化凡患

癰癰等症者即以此水浸遍體甚驗若以浴小孩則碘及

鈹碘各分兩須減去三分之一至若浴四肢之一則碘藥

及水又應酌用十分之一二便合

鋏碘

此物由碘合鋏養煅製而成也

形色

色白不過光凝珠作立方形能牽吸天氣之水溼而自

化

氣味

味辛而鹹

溶化

清水化之甚易以火酒化則不及水

敷驗

法以鋏碘一粒放入銅杓隨加濃磺強水數滴燂熱目

能令碘質分出若復將該碘而投入漿水內即呈藍色也

功用

略同碘質亦可作敗病藥並治風溼鉛病腹痛及疔毒

舊症

服法

每服自三釐至分半日服三次以多水沖服此藥能

療癰癰疔症服法則詳硃質篇內

經驗

疔墜骨痛服此多效昔有西醫曾以鈹碘療是症者凡二百五十名每症每日投以此藥三分八釐分三次服每次以清水一兩二錢沖服所有各症約經服三十八日其中獲全愈者一百四十五獲功效者四十九而不驗者僅五十六云大抵服後間有喉潤或鼻流水恍若傷風而且久服是藥或致舌腫作紋蓋人若與是藥不相宜者服後輒多作悶腹痛發瀉然亦有恒服鈹碘而弗患此者變通用之可也入藥或合碘用之或獨自用之均可蓋硃質則須合鈹碘方能化惟鈹碘則用水即可溶而不必區

區合碘也

雜治
通用

由疔毒而生骨衣症者宜以此藥合金雞納霜同服

疔後皮膚起症服此甚驗 水臌係因肝症而致者宜服

面風瘰癧痛係非由腦氣筋者宜服 半身不遂及久咳

症服此藥問獲功效 凡各種雜症係因久患疔毒而致

者卽以鉍碘治之遠勝別藥每服八釐每日服四服大約服

至半月或一月方見應驗然或服至一月仍未見功每次

須服一分半或四分日服三四次自可獲效

論列

邇來藥肆所貨沙沙把列藥水其能療治花柳等症而

實因內有鉍碘之力也

信石

此物本鑊養也，由鑊探得者，多溷雜質，惟甌淨方堪入

藥

法以鑊信入膽瓶，將及半，而卽以瓶嘴套連別瓶，其膽瓶

之上，蓋護鐵套，俾免熱耗，而瓶下則以煤氣燈或炭火煅煉，使
鑊養化氣，而過冷瓶，如此卽可成淨珠。

形色

新出甌者，作塊過光，恍似玻璃，若經久則漸變白，不復

通明。

氣味

此物無味，亦幾無臭。

溶化

新鮮通明者，用水十二

兩，則能溶五錢，其陳舊色白者，用水十二兩，則祇化一錢，
五分六釐耳。若以清水十二兩煎沸，則可化一兩三錢七
分之多。

戒慎

第信石一物，酷毒異常。倘服一釐，至數釐，即能傷生。然

或服至數分，則又將大吐，故有多服而反不傷生者。惟服

後不吐，必致戕命。凡服信毒者，則作渴作吐，腹熱如焚，

將必痛至力乏而後死。且此物能蝕肉不敗，故服信毒者，其胃則愈數月而猶在。至欲將
屍貯者，即以信石水曳之，磨則入容，薄為遍體，如此自可

公貯
不朽

解救

先以膽礬或錐礬，吞化水灌之，令其作吐。同時或用牛

奶，或用雞蛋白調水，或用麵粉攪水，令其服而並以水

節洗胃，依此救法，若及早者多獲效。一法，先投藥令

吐，隨即服溼鐵養散。川新製
未乾者令鐵敗厥信毒，自不致傷生也。

此法早用必驗。

功用

此藥略服則開胃補身能令各腑多發津液凡疾作

係屬有定候者

知胃痰腦
急癰之類

用藥療治固首推金雞納霜其次

莫如信石然亦有服金雞納霜莫愈而服信石乃獲痊也

久瘡不愈服之尤宜

主治

一切延纏之症如久患牛皮癬魚鱗癬水蠱癩及遠年

風溼骨痛等類服之甚驗他如手足交節腫或半邊腦筋

作痛等症服此亦效醫者用以作改病藥誠上品也

服法

信石入服劑每釐應分作十服或數服

服驗

若久服則頭皮眼皮作腫面部頑梗而癢口覺熱痛腹

覺脹悶而胃亦多滯凡服信石劑後而倘有此各徵者即

應停服然使過服此藥則縱無已上各徵亦將髮甲自脫而口多涎沫

信石水 製法

淨礬養

一錢零九釐

鋏養炭養

一錢零九釐

臘芬大酒

四地廉量

清水備足

先以玻瓶貯水十二安士

量加入礬鋏二散

煎沸以化盡為度取起俟冷而後加入臘芬大酒且再將清水

攪入以共有十六安士為率

此方所用臘芬大酒不過以設也傳免入錯此耳餘無別用

此藥水每半安士

內函有信石三釐半故內服亦祇宜每次

五

滴每日三服凡應

服信石者宜服此所製之水忌服散末

方劑 汞鑒碘水方

鑒礞

六分

紅汞礞

六分

清水

八安
土量

法先以二散和

水半安土同研俟化而後加入餘水濾淨此藥水色微黃而略濇每服五滴至二十滴每日三服能療疔毒及皮膚生鱗之症但須連服數月方獲功效倘服後或胃不消化頭覺昏痛大便艱澀即宜暫停大抵間十餘日須服瀉劑一次

信石汞水

製法

礞礞

六分

水銀

六分

丁士酌

六分

清水

八安
土

研勻加水便是

解花柳毒每服三滴至十五滴

方論

西醫以信石療癰症自古已然除瘋癰疔毒癰而外其

餘一切頑癬卽以此藥治之多獲功效。初服信石水每
次勿逾五滴，日服三次，宜服在飯後，大抵照此法連服半
月，或一月之久，自獲徵驗。倘服後眼內發熱，或眼胞略腫，
則每服宜減一滴。若夫眼起紅筋，是卽頑癬漸愈之徵，而
無庸過慮，惟以溼布外敷可也。所以眼雖作熱，仍須連服。
二月庶易獲痊。至若內服略久而手心脚心或有發熱，或
作水泡，抑或神倦腹痛，而夜不能寐，如此亦無妨礙，誠以
果能久服定必獲效。蓋恒有久服信石劑而身體轉健者
也。倘經服一月，眼無發熱，則第二月應每服六滴，如連服
兩月仍未告痊，則第三月應每服七滴。如此則未有不全。

愈者也，且全愈後，尚須再服數月，庶無復發。

外治

作藥水一方 信石外搽具丹力

信石

一分三釐

銀炭養

一分三釐

清水

四安士量

和化

又方 藥膏

信石

五分

白藥膏

六錢

研和此二方均治已潰頑瘡

用以外塗，甚妙。惟小兒不宜用，蓋因信石醋毒，倘或誤糊入口，卽妨生命也。

銀綠養

原名信膏 噤口散

此藥製始於一千七百八十六年，漸次通行。

形色

作片珠色白，內不函水，露天氣亦不變。

氣味

無臭，味略鹹，似火硝。

溶化

冷水二十倍方能化一沸水兩倍便能化一此藥燂熱

即發養氣大約每百分能發養氣三十九分

凡作養氣當以此為上品

功用

能作涼劑及改病劑頗利小便此藥或內服或以水化用水節射入迴血管均能令血變為赤色

維治服法

若用發熱而致口爛及發出小瘡者每日宜服此藥三分或一錢分數次服若在小兒每服五釐可也

且小兒常口爛服之亦效

外治一方用鈹綠養

一錢至二錢

清水

十六安士量

和勻搽之

因疔毒而發瘡者宜內服兼外搽口渴及舌有白胎

用此煎水作茶飲之

身熱用鈹綠養

一錢

清水

十六安士

量
和勻分數次服小兒瘡疥由父母疔毒傳染而致者

用鈹綠養一錢 清水十六安 和勻每服一錢每日四服

大抵服至三十日自可獲效

輕淡綠即砂 此物出於火山即生煤處亦有之曩者多用駱駝

之糞燃燒其中即有硃砂此特舊法耳近來即將製煤氣所剩

之水加入磺強酸和勻如此即成為輕淡磺養也由是再加鎢

綠即生鹽煎熱則見其一變為輕淡綠一變為鎢磺養然此猶未淨

也用鐵釜再將此二者同甑將見輕淡綠即行升上用法收取

其氣而自離去鎢磺養矣若加入鈹養或鈹養煇熱即有輕淡

氣發出

淨輕淡綠 製法

輕淡綠 二十
安土 輕淡水 五錢
清水 三十二
安土

先將輕淡綠搗爛入磁鍋內再以清水放入燂熱化淨然後加入輕淡水再燂熱一刻之久乘熱隔淨後仍用磁鍋煎乾水汽煎時不住手攪勻煎至稠結成粗粒爲度若隔淨後俟其冷凝珠用布濾隔出在乾溼氣則爲極淨之輕淡綠也

形色 白靱過光剖開則其紋多直

氣味 無臭味鹹而涼殊不可口

溶化 火酒冷水均能化熱水化之尤易化時則能令水略冷

若甌之可令化盡無餘滓

功用 化痰易出兼可節射外治各症

方劑

一方

淡者主治喉症使痰易出

喉痛漱含亦佳

輻淡綠

三釐

清水

土量

和化

一方

濃者主治喉症使痰不作用法吹藥氣入病者之口

透入肺內可化痰止咳

輻淡綠

一錢

清水

土量

和化

凡大小腸內皮與肺

內皮積血肺久患熱症皆效

一方

治同上

輻淡綠

一錢

甘草膏

三錢

鉅錒葡吐散

三釐

清水

土量

和勻每服五分每兩三點鐘一服

若作嘔則去

鉅錒葡吐散可也

一方 治吐血肝發大水蠱症由肝壞而致者均效

輻淡綠

一錢五分

輕綠酸水

二十滴

清水

十六安士量

和勻每服一兩每兩三點鐘一服

一方 白濁白帶 以水節射入前陰

輻淡綠

二分半

清水

四安士量

和化用

又方 外治塗疥癬

輻淡綠

一錢

豬油

一兩半

和勻

久患咳嗽方 以輻淡綠置鐵板上炙令化氣吸入喉內可治

外治 藥酒方 治風溼或跌打骨絞腫熱或腎子發熱均效

輻淡綠

二錢

火酒

兩安士

清水

兩安士

和勻以布溼透

敷患處頻頻換之

魚肝油

製法

用水甌熱鐵板，卽以鮮魚肝在鐵面炙之，令

受熱至一百八十分，便可煉成。

辨別

但此油分三種：一色白，一色棕，一色黑。

形色

色白者，乃鮮魚肝製成，而無甚臭味，最上品也。色棕者，

其魚肝恐不鮮，若由火煎煉而致黑色者，則敗餒魚肝所

製矣。

發明

此油創自日耳曼部，前於道光末年，西醫已將該油功

用，達諸新報，而刻下則尤爲通行之品。凡內傷風溼、鶴膝、癰瘰及遍體發癬等症，均能療治，而內傷服此尤勝。醫者

用以入改病劑誠爲絕妙之品也

經驗

昔有名醫以此油療內傷症凡一百三十四名而獲有效驗者二百零六名其中有全愈者有獲愈過半者大抵內傷人久服此油能令肌肉生長嘗有人連服四月而身比未服之先重逾三十觔者又嘗有連服二十八日而比舊則加重十四觔有奇雖此種奇效未必盡人皆然而要之獲驗者多矣凡內傷者之血水液多而無甚實質惟此油能調補故服之必效也若癰癧裂爛係由先天虛弱而致者服之多驗但此症在貧者少肉食服此尤易見效惟富者慣肉食而服此或難見效耳

通用服法

因癰癤而致骨爛發膿者服此最佳。小兒身弱血薄而致骨軟無力服之尤妙。但須連服旬餘始見徵驗。大約歷四十日後多可獲愈也。蠶食桑症每日宜服八錢或一兩二錢惟服至數月方能奏效。且此症須兼服鈇碘鐵碘等藥庶易告痊。內傷症肺內發瘡服此油勝服別藥。但該瘡之發多寡快慢不一其屬多而快者難治其屬少而慢者則服此可愈。此物大人內服覺有腥悶而小孩啖之則甘甚。凡在小兒每服宜用五分至三錢以白糖或糖水和服。內腑核症宜服。肌肉消瘦係由胃不消化者服之均驗。此油內服或助消化因而益身或云此油

具有補腦功力，及能改變血毒。外治塗癰亦見功效。

一方

魚肝油四安士 炒米粉二錢 白糖二錢 桂皮水或

薄荷水四安士 相和，每服四錢至八錢。

又方

魚肝油一安士 桂皮糖水一安士 八角水一安士 玉桂油

一滴 和勻，每服一錢，每日三服。

方論 倘或應內服而不能下咽者，則用此擦腹部亦驗。

沙沙把列 此樹藤本也，產於南美利、馬西哥、星架波等處。

該樹原有數種，皆根小而長數尺，粗若鷄毛管，久藥用根。

形色

氣味 頗辛

提取

用酒或水浸泡均能提出其功力

功用

此藥能改病及去毒發表凡疔毒頑癰並日久風溼等

症均能療治

方劑

一方 沙沙把列根 二兩 沸水 一兩 泡一點鐘

然後入鍋再煎一刻煎畢取出貯罇此藥水每服一兩

六至三兩能發表去疔毒

又

方 沙沙把列根 十二兩 圭厄木末 二兩 玫瑰花 八

錢

辛拿葉 八錢 甘草 八錢 八角油 五滴 火酒 二

觔

清水 二觔 冰花糖 三角 先將酒水相和浸各藥

一十四天。浸畢濾淨而後入鐺煎使去水至餘二十五兩六錢爲度。由是加入白糖俟化乃取藥水少許令與香油調和隨即投入鐺內合共攪勻然後取起貯入玻璃瓶。此藥水每服四錢日服三次能療上文所列各症。或用此藥水八錢加礬礞八釐化服亦能解疔毒及散癰癤等症。

但英國亦嘗有醫士細驗此藥而謂其無甚功效此不可不知也

水銀

此物入金類亦屬流質一形色狀似珠色似銀能返

光與水比較則重逾十三倍半其在寒暑表冷至三十九分則變爲實物並可鐫薄若熱至六百六十二分又能作沸大抵此物不特烈火能甑而慢火亦可甑誠以其遇平

常之熱亦能上升也

配合

水銀一物和人油類則可作藥膏和人火石粉則可作藥散而且與伊打火酒及硫磺等物亦能相和此物能食別種之金若與別金和勻亦能成爲雜金之品

論服食

昔有英國婦人取以內服蓋欲增其姿色之美也而卒罔效又嘗有老人日服八錢連服九月而究屬如常審是則專服水銀殊無應驗矣惟和別藥以作丸散方有功效

宜忌

此物不宜多服否則或口損或流涎未免貽害且大小腸或有爛處其汞則將墜下乘爛處而泄出試觀製汞工

匠每被汞氣入血而致生病端是知以汞入藥惟得法方有濟耳

汞藍丸一製法

淨水銀

一兩六錢

玫瑰糖

二兩四錢

甘草末

八錢

法以水銀合玫瑰糖

附作玫瑰糖法用將玫瑰糖上帶糖滓三兩去水并楊燭久冰糖整六兩和勻用鐵器

先研至不見

水銀星爲度然後加入甘草末和勻貯罌用時取以作丸照此

製法則是藥料每三釐即面有水銀一釐在內也

形色

氣味

功用

凡用水銀所作各藥當以此爲通行之品蓋藥性純和

可入兒科而且能療各症亦頗同迦路米惟功用則稍遜

而已

主治服法

若作改病藥，每服一釐半至三釐半。若欲輕瀉，則每

服八釐至一分六釐。止瀉則早晚每服八釐，加入鴉片

少許。

寧重

大抵連服三日，口必發涎。彼胃不消化，口苦

舌白，而身覺不安者，宜投一服，兼服輕瀉劑。

如大黃、礬石、礬石等類。

此則能令內腸之積滯瀉出，而且所服之藥亦從此而出。

也。若疳症初起，一日每服藍丸三釐，口服三次。倘服後

而覺牙肉略腫，口涎多流，則暫行停止。蓋服是藥者，究以

口不流涎為貴也。然俟口愈之後，則仍須輕輕再服。誠以

口流涎者，乃服藥見效之徵，而仍當服至三十日。庶易告

痊或云疔毒未易去清服此藥者須至六月之久方能斷根也。大抵用汞治疔每日不宜多服惟能久服不厭自可全愈。

迦路米 製法詳上瀉藥篇內而炎症服此尤驗蓋炎症不一或肺內發炎或肺之胞衣發炎或頭腦發炎或肝胃及大小腸發炎或婦人產後發炎皆能療治。

服法 凡以上各症初起時宜以迦路米先行令瀉後再用此藥一釐至五釐加入鴉片半釐至釐半和勻內服每六點鐘服一次抑或八點鐘服一次十二點鐘服一次亦可惟視症之輕重何如耳重者多服輕者少服無不見效倘服

至數日而或口損發涎大抵服至分即宜暫停

作藥膏方

迎路米

一錢三分半

豬油

八錢

和勻而用以外治

亦妙

紅汞藥一製法

汞綠毒藥

三兩二錢

鈇礬

四兩

清水

八十安土量

先將水二十安土開化鈇礬次用水六十安土開化汞綠毒藥由是將兩藥水和勻煎沸俟冷凝定倒去上面之水其餘聚於底者則復用清水漂洗二次然後焙乾其以藥至百二十分爲度此即紅汞藥也

一功用

療治各症功同汞綠毒藥

一服法

每一釐須分

十二次服

外治

作藥膏方

紅汞碘

一分六釐研幼

白藥膏

八錢

和勻思

癰症者宜將此膏搽十味呢之久搽畢即向太陽曝之曝至覺有痛苦即宜停止依此治法而癰症可愈 大沙蹄症用此搽之亦妙

青汞碘

一製法

用淨汞

一安土量

碘質二百七十八釐

宜照西戔和

勻研之隨將火酒少許以漸加入須研至弗見水銀星及呈青色為度研畢宜在暗室焙乾並用黑罇存貯

功用

同紅汞碘

一服法

每次宜服一釐半至五釐

外治

藥膏方

青汞碘

一錢

豬油

八錢

和勻 凡癰癰裂

爛及惡瘡等症即以此膏搽之甚妙

輕淡汞綠

製法

卷三

輕淡汞綠

汞磺

李

汞綠毒藥

二兩四錢

清水

六十安土量

和勻，燂熱至化，加入輕

淡水

四安土量

頻攪動，俟其凝珠，棄去餘水，而復以清水漂洗數

次，漂畢，用銀淡養水試驗

此法再加些額銀水，露驚度尤妙

以不起鹽為佳，由是將珠

焙乾

其以熟至三二分，每式

貯入玻璃

功用

此藥惟用外治，不入服劑

藥膏方

輕淡汞綠

一錢研末

白藥膏

八錢

和勻，凡久患皮膚

各症及眼邊有爛者，即用此膏搽之，甚驗

汞磺

製法

淨汞

二觔

硫磺

六兩四錢

先以硫黃下鍋煎熔，而後以汞

由漸加入頻頻攪之至全塊發大隨即取起蓋密蓋密俟

冷定取出研細復行入甌升煉而成

形色 此物作長珠其體重其色鮮紅氣味無臭無味

溶化 火酒清水蛤蚧水冷磺強硝酸鹽酸均不能化惟皇強

水乃能化之大抵露置鍋上燒煨即能毀敗惟加蓋方可
甌而不變也

外治 因疔毒而致喉爛者宜以汞磺化氣而口吸之或置

鐵板上炙令化氣薰身亦能治疔毒

紅汞養散聖傳**製法**

淨汞六兩 硝強水四箇半 清水兩安
四錢 安土量 土量

先將此兩水和勻，隨以淨汞三兩二錢加入，令其熔化，用火煎乾，然後將所賸之汞入磁鍋煑熱，合共調勻，如此即成爲三仙丹也。凡爛瘡即用此散搽之，可作丹用。

紅汞養膏 製法

紅汞養散 一錢 研細

黃蠟 二錢

杏仁油 六錢

先將黃蠟煑熔，次以杏仁油加入，俟其將冷，然後加入紅汞散，一併和勻。
形色 此膏新製其色紫，日久則漸變灰色，入藥宜用新製者也。

又方 紅汞養散 一錢 豬油 六錢 白蠟 二錢

法將油蠟先行煎溶，隨以紅汞養散加入和勻。

主治 凡久患惡瘡及眼邊有爛均宜用此二膏搽之

汞黃膏 製法

淨汞 一兩 二錢 煑養酸 二兩 八錢 生油 九兩 六錢 豬油 二兩 六錢

先以水銀投煑養酸中俟其化盡次則另將生油豬油鑄合然後將已化之汞由漸加入即用薄木條頻頻攪之至冷定將凝而再復力攪攪至結稠為度

功用 功同汞藍膏而性尤酷烈 服法 每服分半至五分

但用以內服者亦鮮

外治

若搽小兒頭癬須以番鹹洗淨而後薄搽或再以豬油和淡搽之尤安 風眩爛睫宜以汞黃膏一豬油二和勻

外塗 陰囊痒症宜先洗以白醋後搽此膏 皮膚各種
癬症用以外塗俱妙 凡用此膏療症皆宜搽至極薄庶
免口涎多發

一方 藥膏

汞磺 二錢

鴉片酒 二地 廉量

硫黃末 四錢

白藥膏 四面

和勻凡手內癬症發痒搽之甚妙

汞藍膏

製法

用淨汞 一觔

淨羊油 一兩

豬油 一觔

法先以全汞一觔羊油一兩和豬油二錢力研至不見水銀星
然後將所臘豬油煎熔加入再復細研蓋製此膏者慎毋急躁
須有耐性研至極勻方妥

又淡汞藍膏製法

汞藍膏

四兩八錢

黃蠟

二兩四錢

白欖油

二兩四錢或用生油亦可

樟腦

末

一兩二錢但此物須加入火酒少許方能研末

先將黃蠟煮熔次以欖油相

和俟其將冷然後加入樟腦及汞藍膏一併攪勻

功用

此二膏主治骨絞發腫及皮膚發症係因久患疔毒而致者但須在兩腋下及兩髀裏搽之庶易令汞入血而發

其功力也

論釋

已上用汞所作各藥或內服或外塗或化氣薰之均能

入血而發其功力大抵內服汞藍丸汞銛散及迦路米等

類則能作瀉

詳瀉劑內

若作改病藥則每服宜少許彼內腑若

積餘水服此能消而發炎後若生膜服此能去初服二日


Last page

Vol. III

卷三

三

則臟腑多發津液，頗利大便。至久服，則胃不思食，轉覺多瀉，而肉漸削，面漸白，眼蓋及脚略覺微腫，抑或舊瘡復穿，而致流水。且服略多，則脉數，胃滯，口損發涎，覺有銅味，時噴臭氣，牙肉浮腫，而並現出紅線，由是流涎愈多。每言或看流至三筋者舌起白苔，甚至齒則鬆，喉則爛。問有聖藥，許而喉亦爛，惟小兒歲以服之，則不甚爛，豈不可知也。既難咽，亦難言。然此不特內服爲然也，卽用以外治，亦無不有如是之徵。是知汞藥酷烈，不善用之，反以貽害。惟善用之，方能獲效耳。



H87374

1914

N.3